



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

**ANUÁRIO
Produções Científicas dos Funcionários
do Grupo Hospitalar Conceição
2005/2006**

**Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Março de 2007**

PRESIDENTE

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA SAÚDE

José Gomes Temporão

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

João Constantino Pavani Motta, Diretor-Superintendente e Presidente do Conselho de Administração

Rogério Santanna dos Santos, Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Antônio Alves de Souza, Secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde

José Gomes Temporão, Ministro da Saúde

José Carlos de Moraes, Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde

Osmar Terra, Secretário Estadual da Saúde

Pedro Gus, Secretário Municipal da Saúde

Maria Helena Lemos da Silva, Presidente do Conselho Estadual de Saúde

Marco Antônio dos Santos, Representante dos Trabalhadores do GHC

DIRETORIA

João Constantino Pavani Motta, Diretor-Superintendente

Gilberto Barichello, Diretor Administrativo e Financeiro

Rogério Amoretti, Diretor-Técnico

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA

Julio Baldisserotto, Gerente

Luiz Ziegelmann, Coordenador

©2007 Grupo Hospitalar Conceição (GHC)
Direitos desta edição reservados ao GHC – Rua Francisco Trein, 596,
Cristo Redentor, Porto Alegre-RS, CEP 91350-200 – Brasil
Tel.: (51) 3357-2000 / 3357-2407 - Fax: 3357-2407 e-mail: gep@ghc.com.br
<http://www2.ghc.com.br/GepNet>

Edição e revisão de texto:

Abrahão Assein Arús Neto, João Marcelo Pacheco e Cristianne Maria Famer Rocha

Normalização:

Izabel A. Merlo e Luciane Berto Benedetti

Projeto gráfico:

Abrahão Assein Arús Neto e Cristianne Maria Famer Rocha

Capa:

Abrahão Assein Arús Neto

Periodicidade:

anual

Editora da ULBRA

Diretor

Valter Kuchenbecker

Editoração

Isabel Kubaski

Capa (arte-final)

Juliano Dall' Agnol

Impressão

Gráfica da ULBRA

Comissão Editorial

Airton Tetelbom Stein	Josué de Paula Bahlis
Alberto Salgueiro Molinari	Julio Baldisserotto
Balduino Tschiedel	Luciano Ferraz Schopf
Cristiane Valle Tovo	Luiz Telmo Romor Vargas
Cristianne Maria Famer Rocha	Luiz Ziegelmann
Enilde Eloena Guerra	Maria Helena Schmidt
José Luiz Pedrini	Vera Lúcia Pasini

Anuário da produção científica do Grupo Hospitalar Conceição. V.1, n.1 (1 sem. 2007)- .
Porto Alegre : Grupo Hospitalar Conceição, 2007- .
v. ; 23 cm.

Anual.
ISSN 1981-4828

1. Grupo Hospitalar Conceição – Periódicos.

CDU 001.891(816.5): 614(058)

Sumário

Apresentação	7
Introdução	9
Apresentações, palestras, seminários, workshops	11
Artigos, capítulos de livros e demais publicações	55
Índice de autores	99

Apresentação

A Gerência de Ensino e Pesquisa - GEP/GHC, ao longo dos últimos quatro anos, tem se esforçado no sentido de qualificar a formação profissional e o desenvolvimento institucional. A partir da Certificação, em 2004, pelo MEC/MS, dos hospitais do Grupo como Hospitais de Ensino, as responsabilidades intra e inter institucionais na área de ensino e pesquisa aumentaram consideravelmente.

Para que este esforço se materializasse na prática, dois passos fundamentais e estruturantes foram dados com sucesso:

- a ampliação do quadro de funcionários da GEP, constituindo-se na Gerência uma equipe interdisciplinar, o que vem possibilitando a organização e a implementação de novas ações e programas voltados para o ensino e pesquisa, direcionados para a qualificação profissional dos trabalhadores da instituição, bem como dos residentes e estagiários curriculares;
- a criação de um espaço físico ampliado e qualificado, com mais salas de aula e com a instalação dos recursos tecnológicos (equipamentos audiovisuais), necessários ao pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Dentro do processo de qualificação profissional, foram várias as iniciativas desenvolvidas pela GEP, mas gostaria de salientar aquelas que, pelo seu significado e alcance em relação à contribuição científica, vem possibilitando colocar o GHC em uma outra dimensão institucional:

- a criação da Residência Integrada em Saúde (RIS): representa uma quebra de paradigma dentro dos horizontes da formação e viabiliza, para o Sistema Único de Saúde (SUS) profissionais de diversas profissões da área da saúde preparados para o desenvolvimento da atenção integral em saúde;
- o acesso ao Portal Capes e Portal PROQUEST: tem produzido um outro significado em relação à busca qualificada de informações e de acesso ao conhecimento;

- a aquisição de livros, principalmente através do PI: possibilitou a disponibilização de recursos para uma ampliação do acervo bibliográfico, sendo estas aquisições democratizadas a todas as áreas/setores profissionais, independente do nível de formação;
- a transformação da Biblioteca em um Centro de Documentação com perfil multiprofissional, com acervo bibliográfico diversificado, atendendo uma multiplicidade de demandas dos vários campos de saberes;
- os programas de incentivo à pesquisa institucional do GHC com recursos do Fundo de Fomento à Pesquisa: possibilita estimular os pesquisadores da instituição a desenvolverem pesquisas de interesse ao SUS e ao GHC e a ampliar os horizontes relacionados às produções científicas, inovações tecnológicas e fortalecimento de diferentes ações no plano acadêmico.

O Anuário das Produções Científicas se soma a estas iniciativas e tantas outras aqui não citadas, mas com um significado singular, ou seja, o de poder estar resgatando a nossa memória institucional referente aos diferentes conhecimentos que estão sendo produzidos ao longo dos anos desta instituição, mas que passam distantes de todos nós, sem a devida valorização e o cuidado que devemos ter com aquilo que é produzido com muita dedicação e esforço pelos profissionais do GHC. Certamente este Anuário não contemplará 100% da produção científica dos profissionais do GHC nos anos de 2005 a 2006, mas certamente é uma possibilidade de democratizar o conhecimento e as contribuições desta instituição para o aprimoramento e qualificação da atenção à saúde.

Dr. Julio Baldisserotto
Gerente de Ensino e Pesquisa do GHC

Introdução

A GEP/GHC, quando pensou em criar um Anuário das Produções Científicas dos Funcionários do GHC, referente aos anos de 2005 e 2006, além do seu compromisso institucional com o ensino e pesquisa, buscava também resgatar a memória institucional destas produções e, principalmente, valorizá-las pelo que elas podem conter e representar no campo da produção de conhecimento e das novas tecnologias em saúde.

Quando entramos em contato com alguma produção científica, seja através de um congresso/evento científico, artigo publicado ou um livro editado, não temos a clara dimensão do esforço e da responsabilidade pessoal que a mesma demanda. São horas e horas dedicadas à leitura, à pesquisa, à organização do texto e à apresentação. Esta construção não acaba quando da sua apresentação ou publicação, pelo contrário, são nestes momentos que ela adquire sua força maior, sua potência à medida que ela é tomada por diferentes olhares e viaja por diferentes cenários. Passa a ter uma visibilidade e uma discussão que foge do controle dos autores. Ela deixa de pertencer a alguém e passa a pertencer a muitos outros, à ciência, à cultura, à história, mas principalmente ao público, ao social. Por outro lado, paradoxalmente, estas produções têm um rosto que as identifica e nomina, no momento em que são alvo de elogios ou críticas. Elas passam a serem “faladas” e referendadas de forma construtiva ou não, sem que o autor, muitas vezes, saiba. Seu trabalho nas mãos dos outros é como aquilo que escapa, não se toca mais, pertence ao mundo, ao infinito.

Este Anuário pretende ser muito mais que o somatório das produções científicas, que, por si só, já dignificam e reconhecem o empenho profissional, mas ele busca também o reconhecimento e a valorização daqueles que investem bons pedaços de suas vidas na construção de algo que toma um rumo desconhecido, mas sempre em direção aos outros, principalmente em direção à saúde da população mais pobre e, neste sentido, o Anuário contempla a alteridade e sugere uma ética.

Quem produz algo de valor científico está produzindo conhecimento, que pode sugerir uma nova possibilidade ou mesmo alguma incerteza que, no mínimo, gera inquietação e novas buscas. A ciência, os diferentes saberes, as tecnologias inovadoras são oriundas daí e assim se configuram como conhecimento científico.

O Anuário pode se constituir em um novo dispositivo institucional, não só pelo que ele insere no campo do saber, mas principalmente pelo seu valor cultural e sentido que pode produzir, ao estimular os colegas a se aventurarem por outros caminhos do conhecimento e da ciência.

Importante ressaltar que muitos colaboradores do Anuário, provavelmente pela falta de tempo, à medida que estão envolvidos com as tradicionais demandas assistenciais, talvez não tenham conseguido encaminhar suas produções em tempo hábil à GEP. Mas aqueles que o fizeram, mesmo sem terem enviado o resumo das produções, tiveram as mesmas registradas no Anuário, pois entendemos que, por ser este o primeiro, ele traz o novo, o inusual e, portanto, pega de surpresa muitos de nós, autores e autoras, produtores de conhecimentos.

Por último, queremos agradecer a todos os autores que enviaram suas produções, bem como àqueles funcionários da GEP que se empenharam muito neste processo de construção do Anuário, através de ampla pesquisa, contatos e busca destas produções junto aos funcionários ou através do Currículo Lattes, disponibilizado pelos mesmos na Internet.

Luiz Ziegelmann
Coordenador Científico da GEP/GHC



GHC

Grupo Hospitalar Conceição



ORDEM E PROGRESSO

**APRESENTAÇÕES, PALESTRAS,
SEMINÁRIOS, WORKSHOPS**

Apresentações de Trabalhos em Eventos Científicos¹

Título	A avaliação dos resultados das paratireodectomias em hiperparatireoidismo primário no Grupo Hospitalar Conceição (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro GONÇALVES, Iracema Cunha R. CAMPOS, M.A. GOLBERT, Airton AZAMBUJA, Fernando SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, Jul. 2006)

Título	Abordagem do paciente com Diabetes Mellitus Labil
Autor(es)	TSCHIEDEL, Balduino
Evento(s)	XV Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes (Salvador, BA, nov. 2005)

Título	Acesso venoso central em pediatria (*)
Autor(es)	PERUZZO, Anaelí Brandelli LEONARDI, Teresa Barato
Evento(s)	2º Encontro de Enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre, RS, ago. 2006)

¹ Os trabalhos assinalados com (*) são pôsteres.

Título	A importância da incidência da doença multiglandular no hiperparatireoidismo primário e sua frequência, guiado pela determinação do PTH, no trans-operatório (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro GONÇALVES, Iracema Cunha R. CAMPOS, M.A. GOLBERT, Airton AZAMBUJA, Fernando SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, Jul. 2006)

Título	A leitura mediada de contos de fadas como estratégia de enfrentamento em crianças com câncer (*)
Autor(es)	LUZ, Patrícia de Oliveira BONATTO, T. DIEHL, J. MOUSQUER, D. OLIVEIRA, C. SPOLIDORO, M.
Evento(s)	V Jornada Gaúcha de Psicologia Hospitalar (Canoas, RS, set. 2006)

Título	Analysis of dimensional bone growth restrictions with internal rigid fixation placed through areas of rapid bone growth
Autor(es)	CARDOSO, Eduardo Seixas CANÇADO, R.P. OLIVEIRA, Marília Gerhardt de LAMBERTS, M. HEITZ, Claiton
Evento(s)	23ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (Atibaia, SP, set. 2006)

Título	Aplicação correta de insulina: estamos aplicando adequadamente?
Autor(es)	SPEGGIORIN, Silvana Emília
Evento(s)	1º CEDIRS – Congresso de Diabetes do Interior do Rio Grande do Sul (Passo Fundo, RS, maio 2005)

Título	A problemática vivida por mulheres idosas em relação ao envelhecimento do próprio corpo, pertencentes a um grupo de terceira idade que discute problemas cotidianos (*)
Autor(es)	SCHMIDT, Maria Helena
Evento(s)	VII Jornada de Inverno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (Gramado, RS, set. 2006)
Resumo	O presente estudo trata da problemática vivida por mulheres idosas em relação ao envelhecimento do próprio corpo e teve como objetivos analisar a concepção deste fenômeno, caracterizando-se o momento em que elas se perceberam envelhecendo e verificando-se como elas encaram suas limitações e possibilidades em relação a este processo. Objetivou-se, ainda, analisar sentimentos evocados por elas em relação a esta problemática e caracterizar como elas sentem a reação dos outros frente ao seu envelhecimento. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, com enfoque fenomenológico. O universo foi constituído por 15 mulheres pertencentes ao Grupo de Terceira Idade sediado ao Hospital nossa Senhora da Conceição e o número de participantes que decidiram participar foi nove. As entrevistas foram analisadas conforme etapas propostas por Giorgi e com adaptação de Azevedo e Souza. A discussão teórica versa sobre a problemática investigada, utilizando-se principalmente as idéias de Papália, Viscott, Heller e Morin. Os sentimentos evidenciados com maior intensidade foram os negativos, destacando-se a não aceitação do envelhecimento, o desejo de não envelhecer, a tristeza, a acomodação e o conformismo em relação ao processo de envelhecimento. Os sentimentos positivos aparecem em menor intensidade, sendo eles, a valorização da sabedoria e alegria. Nas concepções de envelhecimento, foram evidenciadas principalmente as dimensões biológica e afetiva, seguidas das dimensões estética, sociocultural e espiritual. A dimensão cognitiva e social foram mencionadas por somente uma participante. Quanto ao momento em que as mulheres se perceberam envelhecendo, os principais indicativos evidenciados foram relacionados às dimensões biológica e estética. Em relação à forma como as mulheres idosas entrevistadas sentem a reação dos outros, foi denotada a vergonha do próprio corpo pelo avanço dos sinais exteriores, o sentir-se menos amadas e discriminadas e o sentir um melhor tratamento, além de uma beleza diferenciada. Comprovou-se, desta forma, que o fenômeno de envelhecimento pode ser percebido tanto de forma favorável como desfavorável, tendo prevalecido a desfavorabilidade neste estudo.

Título	Associação entre a hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) e diabetes melito em pacientes mono-infectados pelo VHC e co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	MENEZES, Marcelo Oliveira de TOVO, Cristiane Valle MATTOS, Ângelo Alves de
Evento(s)	Congresso Brasileiro de Gastroenterologia (São Paulo, SP, nov. 2006)

Título	As vantagens da amamentação ilustradas: proposta de um folder educativo
Autor(es)	LENZ, Maria Lucia Medeiros
Evento(s)	X Encontro Nacional de Aleitamento Materno Porto Alegre, RS, set. 2006)
Resumo	A prática da amamentação contribui de modo significativo na saúde da criança. Um grande desafio na promoção do aleitamento materno é o de comunicar-se com a mãe no sentido de auxiliá-la a viver a amamentação de modo saudável. A comunicação é a base para o desenvolvimento de ações efetivas em saúde e várias habilidades e técnicas podem ser utilizadas. Nada substitui uma conversa franca, aberta, sem julgamentos e empática entre profissionais de saúde e a gestante ou mãe. Acreditamos que também poderemos dispor de técnicas visuais que possam reforçar o conhecimento. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um material para ser entregue às gestantes ou mães no sentido de tocá-las sobre as vantagens do aleitamento materno: fortalecimento de vínculo mãe e filho; o fato do leite materno ser limpo, pronto, completo e já aquecido; facilita o funcionamento do intestino do recém-nascido; ajuda o corpo da mãe a voltar ao normal; protege contra a obesidade infantil; facilita o aprendizado da criança; melhora a capacidade de mastigação e deglutição, auxilia na respiração correta, prepara a criança para a fala; favorece a dentição saudável; protege contra alergias em geral; diminui o risco para bronquiolite, otite, asma; diminui o risco para diarreias; reduz hospitalizações; representa grande economia para a família e sociedade; protege a mãe contra a osteoporose e o câncer de mama; ajuda na anticoncepção e planejamento familiar e reduz mortalidade infantil. A mãe que pode e quer amamentar é convidada a conhecer as vantagens do aleitamento materno, através de vinte ilustrações que simbolizam "outros motivos para que isso aconteça". Tratam-se de ilustrações simples, coloridas, alegres e que brincam um pouco com as vantagens de aleitamento.

Título	Avaliação da imunidade celular em pacientes co-infectados com o vírus da hepatite C (VHC) e da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	MENEZES, Marcelo Oliveira de TOVO, Cristiane Valle MATTOS, Ângelo Alves de ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de MATTOS, Ângelo Zambam de
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	Avaliação da incidência de tromboembolismo na gestação (*)
Autor (es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu PIMENTEL, Pedro ESPINOSA, Sérgio
Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006)

Título	Avaliação da influenza no Centro Sentinela implantado no Serviço de Saúde Comunitária – GHC – Porto Alegre no ano de 2004
Autor (es)	LANGONI, Paulo Oscar de Oliveira COSTA, Félix Giambastiani da FLORES, Rui NEVES, Fátima Delurjan Ferreira

Evento(s)	1º Encontro de Enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre, RS, ago, 2005) 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006) 1º Encontro Estadual de Vigilância em Saúde (Porto Alegre, RS, mar. 2006)
------------------	--

Título	Avaliação de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio através do miniteste (*)
Autor(es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. DUARTE, Elizabeth R.
Evento(s)	61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)

Título	Avaliação do impacto na qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com a introdução de um protocolo de cuidados odontológicos no serviço de oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição (*)
Autor(es)	FUNK, Camila Sâmara BALDISSEROTTO, Julio PADILHA, Dalva Maria
Evento(s)	3º EGATESPO, Porto Alegre, RS, nov. (2006)

Título	Avaliação dos fatores de risco para aquisição do vírus da hepatite C (VHC) e da imunodeficiência humana (HIV) em pacientes com co-infecção VHC/HIV
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de MATTOS, Ângelo Alves de

Evento(s)	GALPERIM, Bruno SANTOS, Breno Riegel XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)
------------------	---

Título	Avaliação do uso do AAS como prevenção de eventos coronarianos em pacientes inscritos no programa de hipertensão na unidade de saúde nossa senhora aparecida do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição (*)
Autor(es)	VIEIRA, S.B.B. FILHO, V.H.J. TAVARES, M.R.G. COSTA, M.A.P.
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Avaliação mecânica e microscópica da laserterapia (830nm) no processo de distração osteogênica em mandíbula de ovelhas
Autor(es)	CERQUEIRA, A. GUIMARÃES, K.B BEZERRA, M.F SILVA, D.N. HEITZ, Claiton
Evento(s)	23ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (Atibaia, SP, set. 2006)

Título	Brincando na lona (*)
Autor(es)	NUNES, Fernanda Crespo CIVARDI, Katia Augusta CARLSON, Vivian
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Carcinoma mucoepidermóide brônquico de baixo grau: relato de caso (*)
Autor(es)	FENNER, A. ARAÚJO, E.S. FELDENS, L. SILVA, P.S.G. KULCZYNSKI, R. ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria NUNES, P.C.
Evento(s)	XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica (São Paulo, SP, out. 2006)

Título	Cardiopatia e gestação (*)
Autor(es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu PIMENTEL, Pedro ESPINOSA, Sérgio
Evento(s)	61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)

Título	Cirurgia cardíaca em endocardite infecciosa (*)
Autor(es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu R. PIMENTEL, Pedro REY, Nei A. SOUZA, Blau Fabrício de

Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006) 61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)
------------------	--

Título **Cirurgia de tireóide em regime quase ambulatorial em um serviço de endocrinologia clínica e cirúrgica – resultados em 8 anos com 1.709 cirurgias (*)**

Autor(es) MOLINARI, Alberto Salgueiro
GONÇALVES, Iracema Cunha R.
CAMPOS, M.A.
GOLBERT, Airton
AZAMBUJA, Fernando
SIQUEIRA, D.R.
CARPENA, M.P.
COSTENARO, F.
MOLINARI, D.F.

Evento(s) Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, Jul. 2006)

Título **Coarctação de aorta e gestação – relato de caso (*)**

Autor(es) CARELLI, Leonardo F.
WITTKE, Estefania I.
STEINHORST, Ana Maria Pasquali
DAL POZZO, Anderson
ESPÍNDOLA, Leonardo A.
SANTOS, Débora Santos dos
ROMBALDI, Alfeu
PIMENTEL, Pedro
ESPINOSA, Sérgio

Evento(s) XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006)

Título	Condição de saúde bucal e qualidade de vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço do SUS
Autor(es)	ARAÚJO, S.S.C. PADILHA, Dalva Maria BALDISSEROTTO, Julio
Evento(s)	XVIII ENATESPO, VII Congresso Brasileiro de saúde Bucal Coletiva e IV Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal (Salvador, BA, abril, 2005)

Título	Condições de saúde bucal e qualidade de vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço de um Centro Hospitalar de Porto Alegre
Autor(es)	ARAÚJO, S.S.C. PADILHA, Dalva Maria BALDISSEROTTO, Julio
Evento(s)	III Congresso Saúde e Qualidade de Vida do Cone Leste Paulista (São José dos Campos, SP, maio, 2005)

Título	Conhecimento sobre os métodos contraceptivos por jovens de uma escola estadual de educação básica (*)
Autor(es)	TELO, Shana Vieira WILHEMS, Daniela Montano MAY-BRITT, Heyer
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Cuidados a pacientes com lesões de pele (*)
Autor(es)	PERUZZO, Anaelí Brandelli NEGELISKII, Christian ANTUNES, Maria Cristina PIGNONES, Rosane TRAMONTINI, Silvia Justo

Evento(s)	II Encontro de Enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre, RS, ago. 2006)
------------------	---

Título	Cuidando de quem cuida: a saúde dos trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição
Autor(es)	PEREIRA, Mônica Villela BORBA, Elza Maria Vernet de POSSA, Lisiane Boer VARGAS, Tatiane Moreira de
Evento(s)	1ª EXPOGEST - Mostra Nacional de Vivências Inovadoras de Gestão no SUS (Brasília, DF, maio 2006)
Resumo	O Serviço de Saúde do Trabalhador/GHC, em Porto Alegre/RS, vem reestruturando o seu projeto de atenção à saúde dos trabalhadores. Essa reestruturação visa a desenvolver ações de atenção integral à saúde com ênfase na identificação, monitoramento e intervenção nos locais de trabalho buscando reduzir os riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Através das equipes de referência, responsáveis por um universo delimitado de trabalhadores, o Serviço de Saúde do Trabalhador/GHC está potencializando esta participação. Trata-se de uma inovação na medida em que estamos superando as ações individuais e controladoras que historicamente prevaleceram nesse contexto. A perspectiva é de construir com os trabalhadores, nos seus locais de trabalho, o diagnóstico e as propostas de intervenção, no sentido de minimizar riscos e agravos, garantindo a qualidade de vida e de saúde. Dentre os resultados alcançados, destaca-se o aumento da procura pelo Serviço como espaço de escuta e acolhimento das questões trazidas pelos trabalhadores, com a possibilidade de planejamento de intervenções. Essa vivência tem possibilitado um significativo aprendizado no cotidiano das práticas em saúde.

Título	desenCAPSulando a psicologia
Autor(es)	MEIRA, Ana Cláudia Santos BALDINI, Vanessa Mendes BAGOLIN, Eduardo Ilha CIDADE, Renata Dotto
Evento(s)	Trabalho apresentado na X Jornada da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, em outubro de 2006, como tema livre
Resumo	O empreendimento de desenCAPSular a psicologia das práticas mais convencionais tem ganhado cada vez mais espaço no pensar sobre nosso exercício. Este é nosso objetivo com este trabalho: mostrar uma das formas pelas quais

a psicologia como atividade profissional pode sair dos modos tradicionais de seu *quehacer* – a clínica privada, a escola ou a empresa – e ganhar mundo. O trabalho desenvolvido pela Psicologia no Centro de Atenção Psicossocial Adulto – CAPS II – do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é nosso cenário. Este Serviço está em consonância com a proposta de Reforma Psiquiátrica que ganha, nos CAPS, a possibilidade de solidificar-se numa sociedade ainda propensa em pensar o *diferente* como *improvável*. Buscamos mostrar, através das atividades desenvolvidas com usuários e profissionais do Serviço de Saúde Mental, que é fundamental levar a psicologia para mais além, abrindo outras frentes, novos olhares, horizontes diferenciados, lugares inexplorados, provando ser possível nos aproximarmos do que até a pouco nos era distante – a loucura encapsulada – e transitar então por fora das *cápsulas* construídas por nós mesmos nesta profissão que nos é tão rica.

Título	Curso de Gestantes: Unidade de Saúde Parque dos Maias (*)
Autor(es)	PEREIRA, Adriana de Souza MACHADO, Alexandra LIMA, Maite MICHELS, Raquel BAES, Wilma
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Descrição e reflexão do processo educativo com um grupo de mulheres na micro-área de risco da Domingos Rubbo (*)
Autor(es)	MACIEL, Ana Lúcia da Costa SILVEIRA, Naiani FERNANDES, Leonardo BERTONI, Simone Faoro PEKELMAN, Renata
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Desenvolvimento do planejamento em saúde através da estimativa rápida na unidade divina providência – SSC/GHC (*)
Autor(es)	SANTROVISTCH, Cátia Silvana de Lima RÉUS, Deise Rocha ZILLI, Henrique Gheno TEDESCO, Janaina dos Reis

	PORCHER, Raquel de Castilhos RAUPP, Bárbara SORDI, Silvana PADILHA, Leni
Evento(s)	2ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2006)

Título	Deteção de alterações ósseas em cabeças mandibulares de pacientes com artrite reumatóide através de visualização 3D
Autor(es)	MAEDA, Fabio Kunihiro SILVA, Ana Maria Marques da MELO, Leônilson Gaião de HEITZ, Claiton OLIVEIRA, Marília Gerhardt de
Evento(s)	IV Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software e V WIM - Workshop de Informática Médica (Porto Alegre, RS, jun. 2005)

Título	De volta prá casa & asma – vigilância à saúde da família que convive com asma em um serviço de atenção primária à saúde
Autor(es)	LENZ, Maria Lucia Medeiros PIRES, Norma Vieira FLORES, Rui
Evento(s)	XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (Fortaleza, CE, nov. 2006)
Resumo	Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, composto por 12 Unidades de Saúde de Atenção Primária, é responsável por uma população de 125.000 moradores de áreas adscritas da cidade de Porto Alegre. Conta com um Núcleo de Epidemiologia e de Educação em Saúde. As avaliações sistemáticas realizadas no Serviço de Saúde Comunitária (SSC, 1999) identificaram problema importante: um elevado número de crianças entre 0-18 anos vinha hospitalizando. A partir de julho de 2000 passou-se então a identificar diariamente todas as internações (total - 5.800) nessa faixa etária ocorridas nos quatro hospitais do GHC. Para estas crianças/adolescentes, é facilitado o acesso ao Serviço no momento da “volta prá casa”, através do envio de aerograma às famílias e de visita domiciliar imediatamente após a alta. O objetivo é reduzir as internações, que levam a sérias implicações às famílias, apresentam custo elevado e muitas vezes precedem a morte. A asma, mesmo sendo considerada uma condição sensível de atenção ambulatorial (Billings et al, 1996) aparece como o primeiro motivo de internação e reinternação hospitalar no GHC nessa faixa etária e encontra-se entre os principais motivos de

consulta no SSC. Estudo de Demanda (SSC, 1999) mostrou ainda que 90% dos atendimentos de asma ocorriam em consultas de urgência e em 95% destas, somente o tratamento da crise era prescrito. Essas informações levaram a implantação do De volta pra casa & Asma (SSC, 2001) que inclui: capacitação e assistência multiprofissional, elaboração de diretrizes de atendimento e guia de visita domiciliar, grupos de educação com a elaboração de material educativo e acesso à medicação. O aperfeiçoamento contínuo de um sistema de informação permite avaliação sistemática das ações (de processo) e resultados (de impacto) através da utilização de indicadores como cobertura e frequências de internações anteriores e posteriores ao acompanhamento e de internação por asma em relação ao total de internações. Atualmente 1.500 pacientes encontram-se em acompanhamento. As famílias são visitadas precocemente e acompanhadas em 90% dos casos. O projeto desencadeou educação continuada nas equipes, maior valorização profissional, mudança no enfoque do tratamento, participação ativa das famílias envolvidas, otimização dos recursos, envolvimento com estágio curricular dos residentes e maior integração entre os diferentes pontos de atenção (primário, secundário e terciário). Após o período de um ano, reduziu-se a internação por asma em 9% ($p=0,4$ – RR 1,65) nas Unidades onde o projeto tinha sido implantado, não ocorrendo redução nas demais Unidades. Em 2005, reduzimos em 25% o total de internações no SSC e desde 2003 o percentual de internações por asma vem diminuindo (19% em 2003, 16% em 2004, 14% em 2005). Nossos passos na redução de internação por asma: 1999 SENSIBILIZAÇÃO dos profissionais evidenciando a frequência do problema (asma) e do tratamento até então instituído (essencialmente das crises) e revisão sobre diagnóstico/tratamento da asma com INTEGRAÇÃO da atenção primária com serviços de Referência. 2000 a 2005 CAPACITAÇÕES E EDUCAÇÃO PERMANENTE de todas as equipes multiprofissionais. 2006 REVISÃO DAS DIRETRIZES CLÍNICAS e reestruturação do SISTEMA DE INFORMAÇÃO do Programa.

Título	Educando para o uso racional de medicamentos (*)
Autor(es)	RÉUS, Deise Rocha TIERLING, Vera Lúcia KOPITKE, Luciane
Evento(s)	2ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2006)

Título	Encefalopatia tireotóxica auto-imune (*)
Autor(es)	CAMPOS, M.A. SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F. CUSIN, T.

Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, Jul. 2006)
------------------	--

Título **Ensaio clínico randomizado de retirada imediata da bainha femoral e deambulação precoce versus manejo conservador após intervenções coronarianas percutâneas**

Autor(es) AUGUSTIN, Andrea Camelia
QUADROS, Alexandre Schaan de
SARMENTO-LEITE, Rogério E. G.
GOTTSCHALL, C.A.M.

Evento(s) XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006)
19º Fórum de Enfermagem em Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)
61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)
XXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e XII Congresso da Solaci (Porto Alegre, RS, jul. 2006)

Resumo Introdução: Estratégias que avaliem segurança, conforto e diminuição do tempo de internação de pacientes (pts) submetidos a intervenções coronarianas percutâneas (ICP) têm sido estudadas. A retirada da bainha femoral em 4-6 horas após o procedimento é um dos protocolos mais utilizados, embora seja sustentado por poucas evidências científicas.
Objetivo: Avaliar a segurança da retirada imediata da bainha arterial e deambulação precoce após ICP por via femoral.
Métodos: Ensaio clínico randomizado em pts submetidos a ICP pela via femoral com bainha 6F em um hospital de referência, com volume >1500 procedimentos/ano. Todos os pts foram tratados com AAS, tienopirídínicos e heparina EV 100 UI/Kg durante o procedimento, tendo o TCA medido ao seu final. O grupo randomizado para intervenção (INT) teve a bainha retirada imediatamente após o final da ICP, exceto se TCA > 350 segundos, quando a bainha era retirada 1 hora após. No grupo CON a bainha foi retirada 4-6 horas após o final da ICP. A compressão do sítio de punção foi sempre manual até o completo estancamento do sangramento. Foram excluídos pts tratados com inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, heparina de baixo peso molecular ou trombolíticos. O desfecho primário foi complicação vascular maior (sangramento arterial no sítio de punção, hematoma >5cm e pseudoaneurisma). Desfechos secundários foram hematomas menores (<5cm) e conforto do paciente, analisado pela dor e frequência de retenção urinária.
Resultados: As características de base dos grupos INT (n=172) e CON (n=175) foram semelhantes: idade (59,7±9,9 vs 61,0±10,4), sexo masculino (64% vs 57%; p=0,24), IMC (27±3,9 vs 27±3,6) e TCA (324±101 vs 320±101). Não houve diferença estatisticamente significativa na incidência de complicações vasculares maiores (INT=1,7% vs CON=0,6%; p=0,31), sendo que a bainha

foi retirada 1 hora após por TCA>350 segundos no grupo INT em 31 pts. A incidência de hematomas menores antes da retirada da bainha foi semelhante nos grupos INT e COM (2,3% vs 4%;p=0,36), porém o grupo INT apresentou mais hematomas menores após a retirada da bainha (7,5% vs 2,9%;p=0,05). A frequência de reações vagas foi aproximadamente 3% em ambos os grupos. Os pts do grupo INT tiveram menos dor (26% vs 41%; p=0,004) e dor intensa (6% vs 14%; p=0,01) do que o grupo CON, mas a frequência de retenção urinária não apresentou diferença estatisticamente significativa.

Conclusões: A retirada da bainha femoral imediatamente após o término da ICP não está associada com aumento de complicações vasculares maiores. A retirada precoce esteve associada com mais conforto do paciente e maior incidência de hematomas menores de 5 cm. Esta estratégia pode se tornar uma alternativa importante para pacientes com dificuldades para permanecer em repouso após a intervenção, por dor, retenção urinária ou outros fatores.

Título	Ensino e assistência com abordagem interdisciplinar de famílias de crianças hospitalizadas
Autor(es)	CASTRO, Rodrigo Caprio Leite de LENZ, Maria Lucia Medeiros PIRES, Norma Vieira FERNANDES, Carmen CURRA, Leda Dias
Evento(s)	VII Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade (Belo Horizonte, MG, maio 2005)
Resumo	O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do SSC forma profissionais através de atuação em equipe multidisciplinar, inserida nas comunidades sob seus cuidados. Em 2004 iniciou-se um Programa de Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade, ampliando-se o número de categorias profissionais que passaram a receber formação. O compromisso com a qualificação do ensino na prática integradora estimulou a criação de campo de estágio vinculado ao Projeto De volta pra casa que identifica crianças internadas pertencentes à área de abrangência deste serviço, facilitando o acesso às unidades de atenção primária à saúde (APS). O objetivo deste trabalho é de apresentar uma proposta de ensino em serviço que vem sendo desenvolvida no SSC na formação de recursos humanos para a APS com ênfase na abordagem interdisciplinar de famílias de crianças e adolescentes que necessitaram internação hospitalar. Participam durante um mês, residentes de segundo ano das áreas de medicina de família e comunidade, odontologia, enfermagem, serviço social e psicologia. A equipe responsável pela supervisão é formada por médicos de família e comunidade, enfermeiras e terapeutas de família. O estágio vem sendo avaliado pela equipe responsável, equipes de saúde e residentes, como momento favorável ao diagnóstico da situação familiar, à identificação de situações de maior impacto na saúde destas famílias, as discussões de casos interdisciplinariamente, à elaboração na sugestão de plano de acompanhamento às equipes de APS e ao reconhe-

cimento da importância da integração entre os diferentes pontos de atenção. As avaliações favoráveis por parte dos residentes, equipe responsável e equipes de Aps possibilitaram a inclusão desta proposta ao Programa de Residência, mostrando que poderá ser facilmente reaplicada em outros serviços ensino e assistência.

Título	Estratificação de isquemia pós-infarto agudo do miocárdio através do teste ergométrico (*)
Autor(es)	DUARTE, Elizabeth R. STEINHORST, Ana Maria Pasquali WITTKE, Estefania I. STEIN, Airton Tetelbon
Evento(s)	XIII Congresso Nacional do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular (Florianópolis, SC, nov. 2006)

Título	Hospitalizações entre crianças e adolescentes no território de abrangência de um serviço de atenção primária
Autor(es)	LENZ, Maria Lucia Medeiros PIRES, Norma Vieira STEIN, Airton Tetelbon FLORES, Rui
Evento(s)	23º Congresso AMRIGS, Porto Alegre, out, 2006
Resumo	A hospitalização de uma criança, além de sofrimento familiar importante, é um evento de custo elevado para o sistema de saúde e muitas vezes previsível no nível ambulatorial. O objetivo foi descrever e identificar o percentual de hospitalizações por condições sensíveis à atenção ambulatorial (CSAA) que se referem aquelas em que a atenção efetiva e a tempo podem evitar internação. Foram estudadas 3.329 hospitalizações em menores de 19 anos, ocorridas nos anos de 2001 a 2004, em quatro hospitais do SUS, principais referências para uma população de áreas adscritas de um serviço de atenção primária em saúde (APS). A identificação da hospitalização da população foi realizada através do sistema de informação hospitalar do GHC. Análises univariadas e multivariadas foram empregadas para verificar associação entre variáveis independentes e a ocorrência de hospitalizações por CSAA. Identificou-se uma taxa anual de hospitalização de 2,9% na faixa etária estudada. As doenças do aparelho respiratório é o grupo de causa mais freqüente (36%), seguido das doenças perinatais (14%), doenças infecciosas e parasitárias (10%), doenças do aparelho digestivo (9%) e causas externas (6%). As reinternações corresponderam a 16% do total de internações. A taxa de hospitalização por CSAA foi de 35,6%,

variando de 25% a 43% entre as Unidades. As variáveis relacionadas à maior ocorrência de hospitalizações por este motivo foram: - idade de 1 a 4 anos ($p<0,01$), - ter ido direto para o hospital porque a Unidade estava fechada ($p=0,04$) ou – ter ido direto pela gravidade do caso ($p=0,03$). O estudo aponta para a necessidade de incrementar ações de vigilância às hospitalizações por CSAA, que ocorrem com maior frequência nos meses de inverno; às crianças de 1 a 9 anos, por apresentarem-se mais vulneráveis à hospitalização por essas condições e às reinternações, não reduzidas nos últimos quatro anos.

Título	IAM perioperatório nos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica (*)
Autor(es)	STEINHORST, Ana Maria Pasquali WITTKE, Estefania I. DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu PIMENTEL, Pedro REY, Nei A. FABRÍCIO, Blau
Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006)

Título	Incidência de cardiopatia na gestação (*)
Autor(es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu PIMENTEL, Pedro ESPINOSA, Sérgio
Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006)

Título	Justificativas para o desmame precoce de mães atendidas em uma unidade de saúde do SSC/GHC, Porto Alegre-RS (*)
Autor(es)	MENDES, Aderlaine FREITAS, Fernanda RÖPKE, Marcos LEITE, Wanda DIERCKS, Margarita
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Mudanças na microbiologia da peritonite bacteriana espontânea
Autor(es)	ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de TOVO, Cristiane Valle GALPERIM, Bruno ARENZ, Maximiliano Maurell CAMARGO, Nutianne
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	O aborto e a (des) atenção aos cuidados de saúde da mulher de modo integral
Autor(es)	GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima MEDEIROS, Patrícia NARDINI, Milena WILHEMS, Daniela Montano VECCHIA, Liana Della
Evento(s)	XI Encontro Regional Sul da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO): Tecendo Relações e Intervenções em Psicologia Social (Passo Fundo, RS, out. 2006)
Resumo	Este estudo faz parte de um projeto integrado entre o grupo de pesquisa Estudos Culturais e Modos de Subjetivação da PUCRS e o Serviço de Saúde Comunitária de um Grupo Hospitalar eminentemente Público de Porto Alegre.

Neste trabalho temos como objetivo discutir os motivos de internação materna em 2004 e 2005, levantados através dos Relatórios do Serviço de Saúde Comunitária deste Grupo Hospitalar, em específico, o de curetagem pós-aborto, a partir da perspectiva das Políticas Públicas de saúde da mulher, tendo como temática central a ação do Planejamento Familiar. Considera-se internação materna todo e qualquer motivo que leve as mulheres a buscar auxílio médico, a partir da vigésima semana de gestação, e que necessite de hospitalização. Conforme é identificado nestes Relatórios, o motivo de internação materna por curetagem pós-aborto equivale a 43% e 46%, nos anos de 2004 e 2005, respectivamente, representando quase a metade do índice total destes motivos. A discussão deste trabalho será focada na relação deste índice e o princípio de integralidade para a promoção de saúde, proposto pelo SUS e pelas Políticas de saúde da mulher - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM. Problematicamos este princípio de integralidade indicando a impossibilidade das ações de saúde orientarem e serem efetivas nos cuidados de saúde da mulher, tendo em vista a não consideração destes elevados índices nas ações de cuidados de saúde da mulher.

Título	O comércio de órgãos humanos no direito comparado
Autor(es)	ÁVILA, Gustavo Noroña de GAUER, Gabriel José Chittó GAUER, Ruth Maria Chittó ÁVILA, Gerson Antônio de TURK, Vivian
Evento(s)	VI Congresso Brasileiro de Bioética e Iº Congresso de Bioética del Mercosur (Foz do Iguaçu, PR, set. 2005)
Resumo	Ao longo dos anos temos visto uma técnica, antes experimental, aprimorar-se e chegar a um estágio tamanho de desenvolvimento, que acabou por atrair e dar esperança a muitos doentes, antes sem perspectiva alguma de melhora ou, até mesmo, de sobrevivência. Trata-se do transplante e, como não poderia ser diferente, o seu surgimento acabou por gerar uma série de reflexos nas relações sociais. Como o Direito surge para harmonizar estas relações, o Estado teve de intervir para regulamentar os procedimentos de retirada de órgãos, até mesmo, eventualmente, com a criação de tipos penais. Este tema, por vezes, gera polêmica em razão da diversidade de mundos morais com os quais convivemos. Em países asiáticos como o Japão, Irã, Filipinas, Índia, Turquia, Bangladesh, Coreia e Cingapura, o comércio é terminantemente proibido. Na Europa, a situação não é diferente. A Convenção Européia de Direitos Humanos e Medicina, datada de 1997, prevê que o corpo humano e suas partes não podem ser objeto de comércio. Além disto, Inglaterra, Portugal, França, e Espanha possuem legislação penal específica em relação à temática. Na China, no entanto, a venda é permitida desde que a família do doador concorde. Em nosso país, a despeito da proibição constitucional e de tipo penal previsto na Lei 9.434/97, incessantes são as notícias e até estudos publicados existem sobre o chamado “mercado humano”. Em países com matrizes

morais extremamente diversificadas, onde se evidencia o fenômeno descrito por Engelhardt Jr. como os “estranhos morais”, o consenso em torno de regras mínimas a fim de ser evitado o chamado “turismo transplantatório” é difícil. É possível notar uma divisão moral semelhante à existente no reconhecimento de Direitos Humanos, entre ocidente e oriente. A fundamentação daqueles direitos é tarefa tão difícil quanto o surgimento de regras comuns para a disposição de órgãos mediante remuneração. A obsessão pela igualdade almejada na modernidade acaba, por fim, ressaltando as diferenças e estas estão se mostrando cada vez mais difíceis de serem conciliadas.

Título	O componente imaterial do trabalho em saúde (*)
Autor(es)	FAJARDO, Ananyr Porto
Evento(s)	VII Congresso Nacional da Rede Unida (Curitiba, PR, jul. 2006) 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	A qualidade e a natureza do trabalho em saúde vem mudando ao incorporar espaços de ensino, de aprendizagem e de pesquisa ao exercício da assistência. A Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (RIS/GHC) é desenvolvida em equipe multiprofissional e em serviço com assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais contratados que exercem preceptoría junto aos residentes dessa modalidade de aperfeiçoamento especializado, além de suas atividades técnicas específicas. Passaram, assim, a produzir formalmente serviços e conhecimento, caracterizando o componente imaterial de seu trabalho. O contexto no qual o processo de ensino, aprendizagem e pesquisa é desenvolvido em um ambiente de produção coletiva de saúde contempla um componente imaterial em seu trabalho baseado no modo de lidar com relações, saberes, poderes e práticas interdisciplinares na busca de encontros produtores de saúde, tendo como referência que trabalhar, pensar, fazer, ensinar e aprender são práticas simultâneas. É possível promover a superação da dicotomia entre cuidar, ensinar, aprender e pesquisar em saúde ao proporcionar o reconhecimento do componente imaterial do trabalho na produção coletiva organizada de conhecimento.

Título	O papel do exame de congelação, como adjuvante na decisão da extensão da cirurgia das neoplasias foliculares de tireóide, durante o procedimento (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro GONÇALVES, Iracema Cunha R. CAMPOS, M.A. GOLBERT, Airton AZAMBUJA, Fernando

	SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F. MOLINARI, D.F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, jul. 2006)

Título	O Programa de Formação em Saúde Internacional (PSFI) da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS/OMS): uma estratégia de fortalecimento da saúde pública nas Américas (*)
Autor(es)	ROCHA, Cristianne Maria Famer GODUE, Charles AUER, Annella
Evento(s)	8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	No ano de 2005, o Programa de Formação em Saúde Internacional (PFSI) da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS/OMS) completou 20 anos, com um total de mais de 180 participantes provenientes de vários países da Região das Américas. Este Programa recebe todos os anos um grupo de oito a dez profissionais da área da saúde, que demonstram, através da avaliação do currículo e da experiência profissional, ter liderança e interesse em aprofundar as dimensões internacionais da saúde. O objetivo é que, através da participação destes profissionais no Programa, os mesmos tenham uma ampla visão da evolução das tendências regionais e globais na saúde, desenvolvam um pensamento crítico e estratégico sobre os principais desafios em saúde que os países enfrentam, e uma compreensão e capacidade de ação para a cooperação internacional em saúde. Considerando os inúmeros desafios relacionados aos atuais processos de expansão da globalização e a atuação de determinados grupos, cujos interesses estão intimamente relacionados a tal expansão, são de tal magnitude que certamente ocuparão rapidamente um lugar central nas reivindicações dos movimentos sanitários e na agenda da saúde pública, a formação em saúde internacional, nos mais diferentes países, não somente se faz necessária, como será de vital importância para a manutenção dos direitos adquiridos e a melhoria da qualidade de vida das populações. Dentro deste contexto, o PFSI se propõe a contribuir para o fortalecimento das instituições da Região e dos Países-Membros em sua capacidade de: analisar os fatores internacionais e transnacionais que afetam sua realidade sanitária; projetar políticas e estratégias inovadoras de ação, utilizando as experiências da comunidade internacional e mobilizando seus recursos políticos, financeiros e técnicos; relacionar-se ativa e efetivamente com as instituições do sistema internacional e participar na definição de suas agendas de ação; e, desenvolver relações, projetos e redes de cooperação entre profissionais e instituições da Região. A intenção com a apresentação deste texto, portanto, é, além de

relatar (e resgatar) a história deste Programa ao longo de seus 20 anos, analisar, a partir da trajetória de alguns de seus participantes, a contribuição deste Programa (em seu passado e em seu futuro) para o fortalecimento da saúde pública nas Américas.

Título	Oficina de escrita e psicose: escritas de uma nova história
Autor(es)	MEIRA, Ana Cláudia Santos
Evento(s)	Trabalho apresentado na X Jornada da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, em outubro de 2006, como tema livre
Resumo	Este trabalho pretende apresentar o processo desenvolvido em uma Oficina de Escrita desenvolvida no Centro de Atenção Psicossocial Adulto – CAPS II – do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Este Serviço integra o Serviço de Saúde Mental do GHC, dentro da proposta de desinstitucionalização da doença mental, que encontra nos CAPS a possibilidade de um trabalho diferenciado da internação fechada, junto aos indivíduos que necessitam de tratamento para dar conta de intenso sofrimento psíquico. A Oficina de Escrita compõe uma das modalidades de atendimento de pessoas que encontram – às expensas de um diagnóstico de psicose ou de transtornos graves – um espaço de criação para formas diferenciadas de expressão e de visão das angústias que, de outra forma, parecem levar o sujeito a sucumbir. O grupo é coordenado por duas psicólogas, que exploram com o grupo a escrita de frases, textos e poesias que falam de si, de suas dores, de suas esperanças, desesperanças, de suas perspectivas. A partir de produções de autores, de poetas e de compositores, cada paciente expressa de modo peculiar uma produção particular, que exprime, acima de tudo, o conteúdo que os habita internamente.

Título	Os desafios críticos dos recursos humanos em saúde: resultados da consulta regional nas Américas (*)
Autor(es)	ROCHA, Cristianne Maria Famer RIGOLI, Felix FOSTER, Allison Annette
Evento(s)	8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	No ano de 2005, foi realizada em Toronto (Canadá), a VII Reunião Regional dos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, como parte de um processo de atividades e reflexões realizadas, seja em determinadas sub-regiões e países, assim como em toda a Região das Américas (e no mundo), a fim de se refletir sobre alguns dos problemas existentes e sobre os desequilíbrios na força de trabalho em saúde em um determinado país e na Região como um todo. Uma das atividades preparatórias para esta Reunião foi a realização de uma Consulta Regional sobre os desafios críticos em relação à gestão e edu-

cação dos recursos humanos na saúde. Cada um dos países participantes, portanto, foi convidado a realizar consultas nacionais com atores sociais relevantes, a fim de identificar tanto seus objetivos de longo prazo para o desenvolvimento e a gestão dos recursos humanos, bem como seus problemas/necessidades críticas. A Consulta, estruturada a partir de cinco desafios críticos, buscou apontar reflexões nas seguintes direções: qual a importância dos desafios apresentados para os atores consultados; como se encontram atualmente os países em relação a cada um destes desafios; quais as possibilidades de formulação de estratégias comuns para os países da Região, para a superação de cada um dos desafios existentes. Além disto, para cada um dos desafios indicados, foi apresentado um determinado número de condições consideradas necessárias para a superação destes desafios e foi solicitado aos atores consultados que informassem até que ponto tais condições são realmente necessárias e qual o investimento realizado ou as ações concretas iniciadas, até o momento, pelos países, em cada um dos processos citados. A intenção aqui é apresentar os resultados desta Consulta Regional em relação aos cinco desafios críticos pesquisados, assim como as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelos países e suas perspectivas de trabalharem de forma integrada e cooperada na Região das Américas para superarem os problemas existentes e desenvolverem (ou fortalecerem), seja em relação à gestão, seja em relação à formação, a força de trabalho em saúde.

Título	O tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo primário guiado pelo Mibi-Scan e pela determinação do PTH trans-operatório – momento atual (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro GONÇALVES, Iracema Cunha R. CAMPOS, M.A. GOLBERT, Airton AZAMBUJA, Fernando SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F. MOLINARI, D.F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, jul. 2006)

Título	O Processo de avaliação de trabalhos científicos: a Subjetividade nas entrelinhas dos critérios objetivos
Autor(es)	MEIRA, Ana Cláudia Santos GOBBI, Adriana Silveira

	DAL PRÁ, Alexandra Libardi SEIBEL, Heloisa Pio de Almeida COSTA, Jonas Untertriefallner FERRAZ, Paulo Fernando Monteiro
Evento(s)	Ponto de Encontro “Diálogos em torno da escrita e da pesquisa” da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS, out. 2005)
Resumo	Este trabalho pretende mostrar os achados de uma pesquisa qualitativa realizada pelo Comitê de Escrita da Sociedade de Psicologia do RS. Este comitê tem como objetivo tanto o estudo e a discussão do tema da escrita científica, como a realização de atividades que envolvam tal prática. É neste ponto que se inseriu a atividade de pesquisa. Nossa pesquisa buscou conhecer, explorar e questionar as qualidades essenciais que um texto científico da área da Psicologia – de forma abrangente – deve ter, para ser considerado válido, consistente e, de fato, <i>científico</i>. A coleta dos dados da pesquisa foi levada a cabo através de um questionário e de uma entrevista semi-dirigida com um dos coordenadores de seminário responsáveis pela avaliação dos trabalhos elaborados anualmente pelos profissionais em formação em dezoito instituições de Porto Alegre. À luz de nossos achados, pudemos traçar um panorama das características mais e menos valorizadas por quem avalia trabalhos e levantar diversos questionamentos acerca de uma prática tanto comum quanto subjetiva de nossa área.

Título	O “veto familiar” em transplantes de órgãos
Autor(es)	ÁVILA, Gustavo Noroña de GAUER, Gabriel José Chittó ÁVILA, Gerson Antônio de
Evento(s)	VI Congresso Brasileiro de Bioética e Iº Congresso de Bioética del Mercosur (Foz do Iguaçu, PR, set. 2005)
Resumo	Após o conturbado dispositivo da Lei 9.434/97, que introduziu a doação de órgãos presumida em nosso país, outra medida governamental mostra-se como entrave à transplantação. Trata-se do chamado “veto familiar”, introduzido pela Lei 10.211/2001, que entregou a escolha da disposição dos órgãos aos familiares. Tal regramento demonstra, de forma inequívoca, a extrema dificuldade que o Poder Público vêm demonstrando no tratamento deste assunto. Isto significa que, em ultima análise, ainda que o sujeito manifeste em vida sua inequívoca vontade de dispor de seus órgãos (exemplo: consignando em cartório), quando da sobrevivência de sua morte, se houver negativa da família, aqueles não serão doados. Além da manifesta contrariedade aos desejos do descendente, há um claro desperdício de órgãos em uma permanente situação de escassez. Neste espectro, uma questão fundamental emerge: Existem direitos das pessoas sobre seus corpos mesmo após o evento morte? Segundo Rita de Cássia Turvo Leite, o cadáver é objeto de um direito privado não-patrimonial, de origens consuetudinárias, que tem por conteúdo a faculdade

de determinar o modo e a forma de seu destino normal. Este destino, ao que nos parece, deve ser escolhido de acordo com as convicções da pessoa morta, seja para realizar ou rechaçar a doação de órgãos. Deve-se, então, verificar o que foi manifestado em vida, não só pelo número de beneficiados com os órgãos mas, principalmente, em respeito ao defunto. A vontade de quem não mais é, mas, ainda assim, pode fazer com quem alguém continue a ser, deve ser preservada.

Título	Paratireoidectomia em hiperparatireoidismo secundário em renal crônico experiência dos serviços de endocrinologia cirúrgica e nefrologia do HNSC-POA (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro RAMOS, A.M. MOLINARI, D.F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, jul. 2006)

Título	Perfil dos pacientes com carcinoma hepatocelular em um hospital geral de Porto Alegre – RS
Autor(es)	GALPERIM, Bruno TOVO, Cristiane Valle ARENZ, Maximiliano Maurell SCHNEIDER, N.C. DAMO, D.F. VIEGAS, Ana Cláudia B. ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	Perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica (*)
Autor(es)	WITTKE, Estefania I. STEINHORST, Ana Maria Pasquali

	DAL POZZO, Anderson CARELLI, Leonardo F. ESPÍNDOLA, Leonardo A. ROMBALDI, Alfeu PIMENTEL, Pedro REY, Nei A. FABRÍCIO, Blau
Evento(s)	61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)

Título	Planejamento familiar e aborto: algumas problematizações
Autor(es)	GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima MEDEIROS, Patrícia NARDINI, Milena WILHEMS, Daniela Montano VECCHIA, Liana Della
Evento(s)	VII Seminário Internacional Fazendo Gênero - Gênero e Preconceitos (Florianópolis, SC, ago. 2006)
Resumo	No Brasil, as políticas de Atenção à Saúde da Mulher são propostas e desenvolvidas pelo Ministério da Saúde através do SUS e têm sido tomadas como prioridade governamental. Este trabalho tem por objetivo a análise do documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” – PNAISM – no que tange as questões sobre o Planejamento Familiar. Busca-se levantar quais ações relativas às Políticas de Atenção à Saúde da Mulher de um hospital geral público de Porto Alegre têm sido desenvolvidas em relação ao planejamento familiar, e a correlação destas com a estimativa de aborto neste território. A partir disso, objetiva-se contribuir com dados para uma sistematização das ações desenvolvidas nesse serviço, visando expandir e qualificar a atuação na área da saúde da mulher. A análise sobre as estratégias do PNAISM quanto ao Planejamento Familiar indicam que a temática do aborto não está incluída, o que acaba restringindo os serviços dentro destas Políticas Públicas.

Título	Preditores laboratoriais de atividade inflamatória e de fibrose hepática em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle VIEGAS, Ana Cláudia B. DAMO, D.F. ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de

	GALPERIM, Bruno LANTZ, Fábio ARENZ, Maximiliano Maurell SCHNEIDER, N.C.
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	Problematizando a saúde da mulher: PNAISM e aborto
Autor(es)	GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima MEDEIROS, Patrícia NARDINI, Milena WILHEMS, Daniela Montano VECCHIA, Liana Della
Evento(s)	II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão (São Paulo, SP, set. 2006)
Resumo	A saúde das mulheres tem suscitado um crescente interesse no campo das Políticas Públicas. No Brasil, as políticas de atenção à Saúde da Mulher são propostas e desenvolvidas pelo Ministério da Saúde através do SUS. Globalmente, há uma média de um abortamento inseguro para cada sete nascidos. Por isso, as Políticas de Saúde da Mulher têm sido tomadas como prioridade governamental. Este trabalho tem por objetivo a análise do documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” – PNAISM – sobre o Planejamento Familiar, elaborado para subsidiar as ações na atenção à Saúde da Mulher no período de 2004-2007. Busca-se levantar quais ações relativas às Políticas de Atenção à Saúde da Mulher de um hospital geral público – de Porto Alegre – têm sido desenvolvidas em relação ao planejamento familiar, e a correlação destas com a estimativa de aborto. Com isso, objetiva-se uma sistematização das ações desse serviço, visando à expansão e qualificação na área da Saúde da Mulher. As problematizações sobre as estratégias do PNAISM quanto ao Programa de Planejamento Familiar como: a ampliação e qualificação da atenção deste Programa, incluindo a assistência à infertilidade; a garantia da oferta de métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva; e a ampliação do acesso das mulheres às informações sobre os diferentes métodos anticoncepcionais indicam a não inclusão da temática do aborto no Programa de Planejamento Familiar, restringindo os serviços dessas Políticas Públicas.

Título	Produção de beta-lactamase em haemophilus spp e resistência aos antimicrobianos em um hospital geral de Porto Alegre, RS (2001-2005)
Autor(es)	FERREIRA, J. CASTRO, A.C. ROCHA, M.P. RIBOLDI, G. D'AZEVEDO, Pedro Alves
Evento	39º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (São Paulo, SP, 2005)
Resumo	Em um período de quatro anos (julho/2001 a junho/2005) foram estudadas 410 amostras de Haemophilus spp isoladas de escarro no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre (RS). Foi detectada a enzima beta-lactamase em 113 (27,6%) das amostras pelo método de cefalosporina cromogênica. Destas, 58 (51,3%) apresentaram sensibilidade à ampicilina pelo método de difusão do disco usando meio Haemophilus Test Medium (HTM) e seguindo critérios do NCCLS. Em 297 (72,4 %) amostras não foi detectada beta-lactamase pelo método da cefalosporina cromogênica. Destas, 5 (1,7%) foram resistentes e 1 (0,3%) intermediários à ampicilina pelo método da difusão do disco. Os autores enfatizam a importância da aplicação do estudo da resistência do Haemophilus spp. aos antimicrobianos nas rotinas dos laboratórios clínicos e sustentam a aplicação de mais de um método para esta análise, pois diferentes mecanismos de resistência podem ocorrer.

Título	Programa de tratamento do tabagismo em uma instituição do SUS: resultados preliminares (*)
Autor(es)	OLIVEIRA, Maria Eunice STEIN, Airton Tetelbon PACHECO, A. SEGURA, E.S. BARRETO, E.R.S. PACHECO, I.A. ROMAN, L. SANTOS, R.P.
Evento(s)	XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (Fortaleza, CE, nov. 2006)

Título	Progressão da fibrose hepática em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C e em co-infectados VHC/HIV
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SOUZA, Andréa Ribeiro de ALVES, Ângelo
Evento(s)	VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	Relato de experiência da vivência interdisciplinar em micro área de risco (*)
Autor(es)	NICOLETTI, Alite STEFFENS, Adriana WERMUTH, Sinara Isabel
Evento(s)	2ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2006)

Título	Relato de experiência: estágio optativo da residência junto à supervisão da atenção básica no município de Aracaju/ Sergipe (*)
Autor(es)	PEREIRA, Adriana de Souza TELO, Shana Vieira
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Relato de trauma contuso intestinal (*)
Autor(es)	FELDENS, L. FENNER, A. ARAÚJO, E.S. SOUZA, Joao Carlos Ketzer SILVA, P.S.G. BASSOLS, João Vicente
Evento(s)	XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica (São Paulo, SP, out. 2006)

Título	Reorientando o acesso dos usuários da unidade de saúde santíssima trindade a partir da análise das categorias de atendimento (*)
Autor(es)	SASSI, André Petraglia BARRETO, Danyella Silva LIMA, André Klafke de
Evento(s)	8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)

Título	Residência Integrada em Saúde do GHC: Integração entre profissionais e âmbitos de atenção (*)
Autor(es)	FAJARDO, Ananyr Porto BALDISSEROTTO, Julio SCHMIDT, Maria Helena PASINI, Vera Lucia
Evento(s)	VII Congresso Nacional da Rede Unida (Curitiba, PR, jul. 2006) 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	O Grupo Hospitalar Conceição instituiu a Residência Integrada em Saúde (RIS/ GHC) para assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais nas áreas de ênfase em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Mental e Terapia Intensiva. Circulam entre os âmbitos de atenção primária, secundária e terciária, vivenciando o SUS de forma ampliada. Promove a formação em serviço em equipe interdisciplinar enfatizando integralidade, universalidade e equidade na atenção à saúde, superando limites corporativos e o foco na assistência. Oportuniza a vivência dos processos de ensino, aprendizagem e pesquisa relevantes para o SUS, qualificando a atenção à saúde graças à agregação das ciências sociais e humanas à formação nesse campo. A reflexão teórica é realizada por campo e núcleo de atuação, além do Currículo Integrado, modalidade de formação baseada na compreensão da realidade e na construção coletiva do conhecimento. A RIS/GHC provocou mudanças qualitativas e quantitativas na instituição e constitui uma oportunidade de reflexão para os envolvidos com as atividades de ensino e aprendizagem, oportuniza educação permanente para os trabalhadores da instituição e qualifica a atenção prestada.

Título	Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição: uma experiência de formação para a atenção integral
Autor(es)	BALDISSEROTTO, Julio PASINI, Vera Lucia FAJARDO, Ananyr Porto SCHMIDT, Maria Helena
Evento(s)	Encontro Nacional da ABRAPSO (Belo Horizonte, MG, nov. 2005)

Título	Retenção urinária e seu manejo após intervenções coronarianas percutâneas
Autor(es)	AUGUSTIN, Andrea Camelia QUADROS, Alexandre Schaan de SARMENTO-LEITE, Rogério E. G.
Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006) XXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e XII Congresso da Solaci (Porto Alegre, RS, jul. 2006) 19º Fórum de Enfermagem em Cardiologia (Recife, PE, out. 2006) 61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006)
Resumo	Retenção urinária é um problema freqüente após intervenções coronarianas percutâneas (ICP) realizadas por via femoral, devido à restrição do paciente ao leito por várias horas e à dificuldade de urinar na posição deitada, associada ao uso de comadres e papagaios e à falta de privacidade do mesmo. Objetivos: Avaliar a freqüência da retenção urinária após ICP e seu manejo em um hospital de referência para cardiologia intervencionista. Métodos: Os pacientes foram analisados prospectivamente como parte de um ensaio clínico randomizado que objetivou comparar a incidência de complicações vasculares maiores após a retirada da baina e deambulação precoce versus manejo conservador em pacientes submetidos a ICP pela via femoral. Foram avaliadas estratégias para o manejo da retenção urinária, dando-se preferência a manobras não invasivas e usando a sondagem vesical de alívio apenas quando as primeiras não alcançaram êxito. As manobras não invasivas foram aplicação de calor supra-púbico, lateralização do paciente e colocar o paciente do sexo masculino em pé ao lado do leito para urinar no papagaio ou a paciente do sexo feminino para sentar na comadre enquanto ainda estavam com a baina na região inguinal. Quando estas manobras não foram efetivas, realizou-se sondagem vesical de alívio. Manobras não invasivas, invasivas e urinar ao levantar foram avaliadas através do teste "t" e exato de Fischer. Considerou-se significativo um $p < 0,05$.

Resultados: Foram avaliados 174 pacientes randomizados para deambulação precoce (4h após a ICP, G1) e 175 pacientes randomizados para manejo convencional (deambulação 10h após ICP, G2). As características de base dos pacientes dos grupos deambulação precoce e manejo convencional eram similares, conforme avaliadas pela idade ($59,67 \pm 9,77$ vs $61,01 \pm 10,36$) sexo masculino (63,6% vs 57,1%), IMC ($26,98 \pm 3,86$ vs $26,98 \pm 3,61$) e TCA ao término da ICP ($324,72 \pm 101,42$ vs $319,57 \pm 101,34$). A taxa de necessidade de manobras não invasivas para retenção urinária foi de 1,7% (3 pacientes em cada grupo, $p=1,0$), sendo que 2% dos pacientes do grupo convencional necessitou de sondagem vesical de alívio ($p=0,248$), e 7% dos pacientes do grupo 1 urinaram ao levantar ($p=0,00$). Complicações vasculares ocorreram raramente (1,7% vs 0,6%, $p=0,371$). Conclusões: A deambulação precoce pós ICP propicia conforto e inibe a retenção urinária, podendo ser uma alternativa para aqueles pacientes com tendência a retenção ou que apresentam desconforto importante logo após o procedimento. O tempo de repouso usado no grupo 1 foi compatível com a capacidade de retenção vesical fisiológica. As manobras não invasivas não estiveram associadas com complicações vasculares.

Título	Retirada precoce do introdutor arterial com TCA acima de 180: vantagens e desvantagens para o paciente e implicações para a enfermagem
Autor(es)	AUGUSTIN, Andrea Camelia QUADROS, Alexandre Schaan de SARMENTO-LEITE, Rogério E. G.
Evento(s)	XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e IV Simpósio de Enfermagem em Cardiologia (Gramado, RS, jun. 2006) 19º Fórum de Enfermagem em Cardiologia (Recife, PE, out. 2006) 61º Congresso Brasileiro de Cardiologia e XXII Congresso Sul-Americano de Cardiologia (Recife, PE, out. 2006) XXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e XII Congresso da Solaci (Porto Alegre, RS, jul. 2006)
Resumo	A avaliação da segurança e efetividade da retirada imediata da bainha arterial e deambulação antecipada após o término da intervenção coronariana percutânea (ICP) por via femoral é uma estratégia que pode trazer maior conforto ao paciente após o procedimento. Métodos: Ensaio clínico randomizado com dois grupos de pacientes submetidos a ICP pela via femoral usando introdutor arterial (IA) 6 french e tendo recebido 100 UI/Kg heparina em um hospital referência em cardiologia intervencionista. Os dois grupos tiveram o TCA medido ao final da ICP. Com o TCA abaixo de 350, o grupo intervenção (G1, $n=174$) teve o IA retirado ao término da ICP e deambulou após 3 horas de repouso e no grupo controle, independente do valor do TCA, (G2, $n=175$) o IA foi retirado após 4 horas do término da ICP e a deambulação aconteceu após 6 horas da retirada do mesmo. Todos os pacientes usavam AAS e antiagregante plaquetário previamente. Excluíram-se aqueles que haviam re-

cebido inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, heparina de baixo peso-molecular ou trombolíticos. As compressões eram manuais por 20 minutos e após aplicava-se um compressor mecânico se necessário. Sangramento arterial no sítio de punção, presença de hematomas e pseudoaneurismas foram avaliados por análises bivariadas através de testes “t” e “exato de Fischer”.Apreciou-se a presença de desconforto descrito como dor lombar e retenção urinária nos dois grupos. Considerou-se significativo um $p < 0.05$.

Resultados: As características de base dos pacientes dos grupos intervenção e controle eram similares, sem diferenças significativas. A maioria dos pacientes tinha idade ($59,67 \pm 9,77$ vs $61,01 \pm 10,36$) sexo masculino (63,6% vs 57,1%) , IMC ($26,98 \pm 3,86$ vs $26,98 \pm 3,61$) e TCA ($324,72 \pm 101,42$ vs $319,57 \pm 101,34$). Ocorreram 1,7% vs 0,6% eventos hemorrágicos maiores (1 pseudoaneurisma, 1 sangramento arterial e 2 hematomas grandes), com $p=0,371$). Hematomas pequenos pré (2,3% vs 4,0%, $p=0,542$) e pós ICP (7,5% vs 2,9%, $p=0,057$), tempo de compressão ($21,29 \pm 9,502$ vs $18,94 \pm 10,567$ minutos, $p=0,918$) reação vagal (2,3% vs 2,9%, $p=1$), dor lombar (22% vs 39%, $p=0,001$) retenção urinária necessitando de sondagem vesical (0% vs 2% , $p=0,248$) foram avaliados.

Conclusões: A retirada do IA com TCA acima de 180 e abaixo de 350 segundos seguida de deambulação prematura parece ser uma medida segura quando acompanhada de perto por uma equipe de enfermagem bem treinada , seguindo um protocolo de observação rigoroso. A deambulação precoce oferece vantagens na diminuição de dor lombar e retenção urinária, não tendo demonstrado benefício na supressão de reações vagais.A frequência de hematomas pequenos não foi significativa e os pacientes do grupo 1 manifestaram-se altamente favoráveis à nova abordagem.

Título	Retocolite ulcerativa (RCU) associada a tratamento de hepatite crônica C (HCC) com peginterferon (PEG) + ribavirina (RBV): efeito adverso ou comorbidade? relato de caso
Autor(es)	ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de TOVO, Cristiane Valle GALPERIM, Bruno
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005)

Título	Sarcoidose induzida por tratamento com interferon peguilado para hepatite C crônica: relato de caso
Autor(es)	GALPERIM, Bruno DAMO, D.F. VIEGAS, Ana Cláudia B. ARENZ, Maximiliano Maurell TOVO, Cristiane Valle

Evento(s)	SCHNEIDER, N.C. ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de IIIº Congresso Gaúcho de Gastroenterologia e Endoscopia XXII JACAD, X ENDOGASTRO (Gramado, RS, jul. 2005) XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005) VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)
------------------	--

Título	Saúde e trabalho no mundo atual: fluxos migratórios, processos educacionais e regulações profissionais
Autor(es)	ROCHA, Cristianne Maria Famer
Evento(s)	8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	Os fluxos migratórios de trabalhadores estão crescendo e devem continuar crescendo neste mundo globalizado, graças a inúmeros fatores, tais como as inovações tecnológicas, de comunicação e de transporte, à remoção de barreiras comerciais entre os países e também à redução das diferenças entre as propostas educacionais utilizadas. São muitos os exemplos, continuamente reportados pela mídia, em relação a algumas das oportunidades e das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em geral, mas também aqueles do setor saúde, que procuram, para além de suas fronteiras nacionais, melhores ou diferentes oportunidades de trabalho e de vida. A migração, porém, não pode ser compreendida sem que seja considerada a sua relação com outros dois importantes temas relacionados à regulação e à formação de recursos humanos em saúde. Refiro-me aqui, particularmente, à crescente demanda por cursos “distantes” – que permitem a inúmeros usuários obterem diplomas ou certificados, independente do país de proveniência –, assim como a regulação das profissões da saúde, cujas regras restringem e demarcam o campo do exercício profissional, impossibilitando determinados trabalhadores de exercitarem livremente suas profissões nos países para onde migram. A contradição reside justamente no fato que, ao mesmo tempo que parece aumentar as facilidades para a livre mobilidade dos trabalhadores de diferentes nacionalidades, inúmeras são as ações que buscam construir padrões de qualidade que estandardizam processos, mas que também buscam limitar oportunidades. Neste texto, portanto, faço uma análise da produção discursiva de alguns textos relacionados aos temas acima referidos – migração, formação e regulação profissional na área da saúde –, nos últimos cinco anos, publicados em diferentes periódicos, onde procuro demonstrar que o aumento da migração está direcionando a adoção de ações estratégicas (sejam elas políticas ou práticas) que impactam os sistemas de saúde (globais, nacionais e locais), além de incentivarem a revisão de algumas agendas relacionadas à formação e à regulação dos recursos humanos em saúde.

Título	“Saúde em casa” – Programa de atenção domiciliar pós-alta hospitalar (PAD/GHC)
Autor (es)	KONZEN, Adelaide Lucia KICH, Mônica RATHKE, Cézar RAMOS, Aline de Ávila PICCININI, Glaci MORAES, Luis Eduardo da Rosa ROSA, Jesaias Goulart FONTES, Edimara Pires de Lima GORNISKI, Inara Lock
Evento(s)	Iº Encontro de Atenção Domiciliar no Hospital Universitário de Santa Maria, 2006. Iº EXPOGEST Brasília, ago, 2006
Resumo	Os fluxos migratórios de trabalhadores estão crescendo e devem continuar crescendo neste mundo globalizado, graças a inúmeros fatores, tais como as inovações tecnológicas, de comunicação e de transporte, à remoção de barreiras comerciais entre os países e também à redução das diferenças entre as propostas educacionais utilizadas. São muitos os exemplos, continuamente reportados pela mídia, em relação a algumas das oportunidades e das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em geral, mas também aqueles do setor saúde, que procuram, para além de suas fronteiras nacionais, melhores ou diferentes oportunidades de trabalho e de vida. A migração, porém, não pode ser compreendida sem que seja considerada a sua relação com outros dois importantes temas relacionados à regulação e à formação de recursos humanos em saúde. Refiro-me aqui, particularmente, à crescente demanda por cursos “distantes” – que permitem a inúmeros usuários obterem diplomas ou certificados, independente do país de proveniência –, assim como a regulação das profissões da saúde, cujas regras restringem e demarcam o campo do exercício profissional, impossibilitando determinados trabalhadores de exercitarem livremente suas profissões nos países para onde migram. A contradição reside justamente no fato que, ao mesmo tempo que parece aumentar as facilidades para a livre mobilidade dos trabalhadores de diferentes nacionalidades, inúmeras são as ações que buscam construir padrões de qualidade que estandardizam processos, mas que também buscam limitar oportunidades. Neste texto, portanto, faço uma análise da produção discursiva de alguns textos relacionados aos temas acima referidos – migração, formação e regulação profissional na área da saúde –, nos últimos cinco anos, publicados em diferentes periódicos, onde procuro demonstrar que o aumento da migração está direcionando a adoção de ações estratégicas (sejam elas políticas ou práticas) que impactam os sistemas de saúde (globais, nacionais e locais), além de incentivarem a revisão de algumas agendas relacionadas à formação e à regulação dos recursos humanos em saúde.

Título	Surto de acinetobacter SP pan-resistente em hospital de ensino de grande porte (*)
Autor(es)	DALAROSA, M.G. GERLOFF, K. R. KÖRTING, Hévia MIRANDA, A.B. PUGA, L.S.
Evento(s)	VI Congresso Brasileiro Pan-americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar (Porto Alegre, RS, set. 2006)
Resumo	Introdução: A emergência de <i>Acinetobacter sp.</i> pan-resistente (PAN-R) foi detectada em um hospital terciário de ensino, em Porto Alegre, a partir de janeiro de 2005. Objetivos: Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes que apresentaram <i>Acinetobacter sp.</i> PAN-R em exames culturais e implementar medidas de bloqueio epidemiológico para conter surto. Materiais e métodos: Estudo transversal, descritivo. A população do estudo foi selecionada a partir dos pacientes que apresentaram <i>Acinetobacter sp.</i> PAN-R no período de janeiro de 2005 a junho de 2006. Os <i>Acinetobacter sp.</i> PAN-R foram confirmados através de testes de suscetibilidade aos antibióticos e pelo E-teste para: imipenem, meropenem, ceftazidima, aztreonam, cefepima e piperacilina-tazobactam. Os pacientes foram investigados a partir da identificação laboratorial do <i>Acinetobacter sp.</i> PAN-R, desencadeando assim as medidas de bloqueio epidemiológico e treinamento da equipe. Quando o paciente fez uso de antibioticoterapia, transcorridas 48 horas após o término dessa, foram realizadas coletas para investigação de colonização. No caso dos testes apresentarem resultados negativos, o paciente é considerado colonizado, sendo retirado do isolamento. Em caso de sítio positivo, as medidas de isolamento devem ser mantidas. Resultados: No ano de 2005 foram identificados 29 pacientes com <i>Acinetobacter sp.</i> PAN-R e no 1º semestre de 2006, 65 pacientes; a maioria do sexo masculino: 62% (2005) e 58% (1º semestre 2006). O sítio de maior incidência foi o trato respiratório, também foram identificadas em sangue, urina, ponta de cateter, líquido abdominal e ferida operatória. A unidade com o maior número de casos foi a terapia intensiva, também foram encontrados casos nas unidades de internação clínica e cirúrgica, emergência e sala de recuperação. A taxa de óbitos foi de 58,6% em 2005 e 49% no 1º semestre de 2006. Conclusão: Após a análise realizada nos períodos já citados, observou-se um aumento de casos novos, mediante isso, estão sendo reforçadas as medidas de bloqueio epidemiológico numa ação conjunta do CIH com as equipes multidisciplinares e detecção precoce de novos casos, objetivando a redução dos casos para o 2º semestre de 2006.

Título	The international mobility of latin american nurses: an overview of the situation (*)
Autor(es)	MALVAREZ, Silvina COMETTO, Maria Cristina SIANTZ, Mary Lou de León GÓMEZ, Patricia Fabiana ROCHA, Cristianne Maria Famer
Evento(s)	8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública (Rio de Janeiro, RJ, ago. 2006)
Resumo	The international mobility of highly skilled workers has significantly increased during the past decade. This mobility has been fueled by globalization and competitive admission policies in the developed world. While the documentation of that mobility has recently occurred, it has only identified broad educational categories. For nursing in the Region of the Americas, the last decade has been a historical time of change characterized by a variety of trends and developments that have occurred within a framework of globalization and health sector reform. The field of human resources in nursing has been particularly influenced and transformed by these trends in both positive and negative ways. Currently, the analysis of human resources through nursing research is generating important knowledge that is needed to reorganize health care services. However, this knowledge has been inconsistent and lacked focus. Findings have not been widely disseminated, and have therefore lost much of its potential impact. Within this inconsistent global context, the Second Pan American Symposium on Research on Human Resources of Nursing was held in 2004. The purpose of this Symposium was to identify and discuss research trends concerning human resources in nursing, particularly focused on the mobilization, migration, and shortage of nurses in the 15 countries of Latin America. The purpose of this panel is to present some of the findings based on the discussion and analysis of the data collected during the Second Pan American Symposium. This dialogue is needed to continue and further expand a common understanding of the evolving challenges and implications in human resources within nursing that are not only affecting the present but the also the future throughout the Region of the Americas.

Título	Thoracic pain in a general hospital emergency (*)
Autor(es)	STEIN, Airton Tetelbon DUARTE, Elizabeth R. FILHO, P.P.
Evento(s)	Guidelines on The Danube Workshop (Budapeste, Hungria, out. 2006)

Título	Trabajo en equipo en los sistemas y servicios de salud: una estrategia para la promoción de la salud
Autor(es)	ROSALES, Carlos ROCHA, Cristianne Maria Famer
Evento(s)	<i>Escola Internacional de Verano em Promocion de la salud</i> (Colônia Del Sacramento, Uruguai, 2006)
Resumo	El concepto ampliado de salud presupone la participación de una amplia gama de trabajadores cuyo objetivo es la promoción y la prestación de servicios en función de las necesidades de salud de la población. La organización del trabajo en equipo no es nueva, ya que esta forma de laborar ha sido adoptada en otras organizaciones obteniendo con esto más y mejor productividad (Rosales y Valverde, 1998b). Todavía el trabajo de equipo surge, en las últimas décadas, como un tema novedoso en el contexto del sector salud, a pesar de contar con muchos años de desarrollo, fundamentación teórica, metodológica y práctica en diferentes sectores de la economía y el apoyo de diversas disciplinas. En la práctica, en el sector salud diferentes modelos de prestación de servicios, al igual que varias metodologías, han dado por supuesto el trabajo en equipo. A pesar de esto, en general, no se hace ningún planteamiento explícito de cuál concepción es la que se maneja y de cómo se articula ésta con la práctica, en los servicios de salud. Por tanto para comprender la importancia – o la productividad – de la organización del trabajo en equipo en el sector salud, es necesario analizar contextual y historicamente el uso de la expresión “trabajo en equipo” en este sector, los tipos de equipos existentes y las diferencias entre ellos, la diferencia entre “trabajo en equipo” y “trabajo en grupo”, las ventajas y las desventajas, entre otros aspectos.

Título	Trabalho noturno: um fator que contribui para aumentar a prevalência de tabagismo (*)
Autor(es)	OLIVEIRA, Maria Eunice STEIN, Airton Tetelbon ACHÊ, B. SEGURA, E.S. LIMA, E.J. P. OLIVEIRA, P.J.A.Q. ROSSA, Irma COSTA, M.B.G.
Evento(s)	XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (Fortaleza, CE, nov. 2006)

Título	Tratamento da hepatite crônica pelo VHC com IFN + RBV em pacientes co-infectados com o HIV
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle RIGO, Julio Cesar MATTOS, Ângelo Alves de MATTOS, Ângelo Zambam de
Evento(s)	VII Semana de Estudos da AMEHC - Associação dos Médicos do Hospital Conceição e Criança Conceição (Porto Alegre, RS, out. 2005)

Título	Tratamento da hepatite crônica pelo vírus da hepatite c (VHC) com interferon α-2b e ribavirina em pacientes co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	CESAR, Julio TOVO, Cristiane Valle MATTOS, Ângelo Alves de
Evento(s)	XVIII Congresso Brasileiro de Hepatologia (Campos do Jordão, SP, out. 2005)

Título	Trauma contuso esofágico: relato de caso (*)
Autor(es)	FELDENS, L. FENNER, A. ARAÚJO, E.S. SOUZA, João Carlos Ketzer de SILVA, P.S.G. BASSOLS, João Vicente
Evento(s)	XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica (São Paulo, SP, out. 2006)

Título	Um protocolo institucional de câncer diferenciado de tireóide revisitado após seis anos de sua aplicação (*)
Autor(es)	MOLINARI, Alberto Salgueiro GONÇALVES, Iracema Cunha R. CAMPOS, M.A. GOLBERT, Airton AZAMBUJA, Fernando SIQUEIRA, D.R. CARPENA, M.P. COSTENARO, F.
Evento(s)	Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul (Gramado, RS, jul. 2006)

Título	Um novo olhar para o território da Unidade Conceição (*)
Autor(es)	SANTROVISTCH, Cátia Silvana de Lima RÉUS, Deise Rocha ZILLI, Henrique Gheno TEDESCO, Janaina dos Reis PORCHER, Raquel de Castilhos RAUPP, Bárbara SORDI, Silvana PADILHA, Leni
Evento(s)	1ª Jornada Científica da RIS/GHC (Porto Alegre, RS, dez. 2005)

Título	Viral hepatitis serum markers in patients with human immunodeficiency virus (HIV) infection
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de MATTOS, Ângelo Alves de RIEGEL, Bruno
Evento(s)	World Congress of Gastroenterology (Montreal, Canadá, set. 2005)



GHC

Grupo Hospitalar Conceição



ORDEM E PROGRESSO

**ARTIGOS, CAPÍTULOS DE LIVROS
E DEMAIS PUBLICAÇÕES**

Livros, Capítulos de Livros, Artigos e demais publicações

Título	Accuracy of frozen-section analysis in the diagnosis of ovarian tumors: a systematic quantitative review
Autor(es)	MEDEIROS, L.R. ROSA, D.D. EDELWEISS, M.I. STEIN, Airton Tetelbon BOZETTI, M.C. ZELMANOWICZ, A. POHLMANN, P.R. MEURER, Luíse CARBALLO, M.T.
Publicado em	<i>International Journal of Gynecological Cancer</i> , Cambridge, ano 15, n. 2, p. 192-202, mar./apr. 2005.
Resumo	A quantitative systematic review was performed to estimate the diagnostic accuracy of frozen sections in ovarian tumors. Studies that compared frozen sections and paraffin sections within subjects for diagnosis of ovarian tumors were included. Fourteen primary studies were analyzed, which included 3 659 women. For benign ovarian vs borderline/malignant tumor cases, the occurrence of a positive frozen-section result for benignity (pooled likelihood ratio [LR], 8.7; 95% confidence interval [CI], 7.3-10.4) and posttest probability for benign diagnosis was 95% (95% CI, 94-96%). A positive frozen-section result for malignant vs benign diagnosis (pooled LR, 303; 95% CI, 101-605) increased the probability of ovarian cancer to 98% (95% CI, 97-99%). In borderline vs benign ovarian tumor cases, a positive frozen-section result (pooled LR, 69; 95% CI, 45-106) increased the probability of borderline tumors to 79% (95% CI, 71-85%). In borderline vs malignant ovarian tumor cases, a positive frozen-section result (pooled LR, 18; 95% CI, 13-26) increased the probability of borderline tumors to 51% (95% CI, 42-60%). We conclude that diagnostic accuracy rates for frozen-section analysis is high for malignant and benign ovarian tumors, but the accuracy rates in borderline tumors remain relatively low.

Título	A comparative study on machine learning techniques for prediction of success of dental implants
Autor(es)	BALDISSEROTTO, C. OLIVEIRA, A.L.I. BALDISSEROTTO, Julio

Publicado em | *Lecture Notes in Computer Science*, Berlim, n. 3789, p.939-948, 2005.

Resumo | The market demand for dental implants is growing at a significant pace. In practice, some dental implants do not succeed. Important questions in this regard concern whether machine learning techniques could be used to predict whether an implant will be successful and which are the best techniques for this problem. This paper presents a comparative study on machine learning techniques for prediction of success of dental implants. The techniques compared here are: (a) constructive RBF neural networks (RBF-DDA), (b) support vector machines (SVM), (c) k nearest neighbors (kNN), and (d) a recently proposed technique, called NNSRM, which is based on kNN and the principle of structural risk minimization. We present a number of simulations using real-world data. The simulations were carried out using 10-fold cross-validation and the results show that the methods achieve comparable performance, yet NNSRM and RBF-DDA produced smaller classifiers.

Título | **A comparative study on support vector machine and constructive rbf neural network for Prediction of success of dental implants**

Autor(es) | OLIVEIRA, A.L.I.
BALDISSEROTTO, C.
BALDISSEROTTO, Julio

Publicado em | *Lecture Notes in Computer Science*, Berlim, n. 3773, p.1015-1026, 2005.

Resumo | The market demand for dental implants is growing at a significant pace. In practice, some dental implants do not succeed. Important questions in this regard concern whether machine learning techniques could be used to predict if an implant will be successful and which are the best techniques for this problem. This paper presents a comparative study on three machine learning techniques for prediction of success of dental implants. The techniques compared here are: (a) support vector machines (SVM); (b) weighted support vector machines; and (c) constructive RBF neural networks (RBF-DDA) with parameter selection. We present a number of simulations using real-world data. The simulations were carried out using 10-fold cross-validation and the results show that the methods achieve comparable performance, yet RBF-DDA had the advantage of building smaller classifiers.

Título | **A educação médica diante das necessidades sócias em saúde**

Autor(es) | AMORETTI, Rogério

Publicado em	<i>Revista Brasileira de Educação Médica</i> , Rio de Janeiro, ano 29, n. 2, p.136, maio/ago. 2005.
Resumo	O artigo, de opinião e resgate de debates atuais, aborda a questão da educação médica, no contexto das necessidades sociais de formação de recursos humanos para a organização do Sistema Único de Saúde. A partir do cenário social e histórico da segunda metade do século XX, quando as inovações tecnológicas revolucionaram as práticas médicas, são abordadas as distorções que o mercado da biotecnologia introduziu na educação médica de graduação e pós-graduação, as características principais dos profissionais formados, bem como dos serviços assistenciais e da pesquisa. É também discutido o movimento de mudanças na formação médica, algumas alternativas e propostas de reformas curriculares e do sistema hospitalar brasileiro, na ótica de um gestor público da área da saúde.

Título	A insulina Detemir
Autor(es)	TSCHIEDEL, Balduino
Obra	TSCHIEDEL, Balduino. <i>A insulina detemir</i> . São Paulo: Novo Nordisk, 2006.
Resumo	A insulina é sempre necessária no tratamento do diabetes tipo 1 (DM1), devendo ser instituída assim que for feito o diagnóstico. Já no diabetes tipo 2 (DM2), embora existam vários tratamentos que possam preceder o uso deste hormônio, sabe-se que, após vários anos de diagnóstico, a maioria dos pacientes virá a necessitar de insulina para atingir um bom controle metabólico. Em nossa experiência, a insulina Levemir™ tem se mostrado uma insulina basal adequada, acima de tudo previsível, com conseqüente diminuição da freqüência de hipoglicemia naqueles pacientes que usavam NPH.

Título	A integração horizontal do ensino da patologia no currículo médico
Autor(es)	KLIEMANN, L.M. CARTELL, A.S. ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria GOLDSTEIN, H.F.
Publicado em	<i>Revista Brasileira de Educação Médica</i> , Rio de Janeiro, ano 30, n. 2, 2006.

Título	A inter/transdisciplinaridade como o outro da alteridade
Autor(es)	ZIEGELMANN, Luiz
Publicado em	<i>Jornal do Conselho Regional de Psicologia</i> , Porto Alegre, dez. 2006.
Resumo	O autor coloca em discussão aquelas práticas de saúde institucionais, bem como a clínica do espaço público concebidas dentro da lógica disciplinar ou multiprofissional, que está em consonância com o modo de enxergar o mundo e as coisas pela lógica da razão pura. Neste sentido, o autor pergunta se diante dos desafios que o mundo contemporâneo coloca pela multiplicidade e diversidade de fatores que o compõe e a complexidade inerente aos mesmos se justificam ainda mais ações somente no plano disciplinar? Para o autor, somente uma perspectiva de trabalho profissional no plano inter/transdisciplinar é capaz de abalar e tensionar o território identitário rígido do plano disciplinar que assegura um conhecimento fracionado, referindo-se a apenas um nível da realidade. Numa outra direção se faz a alteridade, em que o outro nos sugere um olhar inter/transdisciplinaridade que diz respeito à dinâmica engendrada pela ação dos diferentes níveis de realidade ao mesmo tempo. A perspectiva do conhecimento apreendido no plano inter/transdisciplinar possibilita perceber a realidade globalmente aberta, portanto oferece uma visão do mundo e das experiências vividas. Exemplo disso ocorre no momento em que os profissionais começam a serem atravessados, invadidos pelo saber alheio do médico, da enfermagem, do histórico-cultural, do psicológico e do filosófico, como exemplos, mas sem que nenhum saber sobreponha-se ao outro. O outro, como abertura permanente e infinita ao conhecimento, ao diálogo, ao compartilhar, se recusa ao totalitarismo do eu disciplinar e da razão que busca converter tudo numa única verdade. O outro recusa submeter-se à lógica do pensamento monolítico, fechado em si mesmo, pois o pensar e fazer centrado no "eu sei" compromete a alteridade. Portanto, o momento inter/transdisciplinar oferece a possibilidade de revelação de uma realidade muito mais dinâmica, relacional e integrada do objeto de estudo, que pode ser tanto aquele que adoece, como o ser humano ou a própria vida.

Título	A mediação da cultura docente na formação médica
Autor(es)	AMORETTI, Rogério URTIAGA, Maria Elizabeth
Publicado em	<i>Revista Interface</i> , São Paulo, ano 9, n. 17. p.417, 2005.
Resumo	A formação médica tem atraído o interesse de pesquisadores e gestores da área da saúde, sendo central para a organização do sistema de saúde no Brasil e para o futuro da medicina em nosso país. Enfoques diversificados como medicina e tecnologia, ética, graduação, reforma de currículo, métodos pedagógicos, pós-graduação, tendências de mudanças, mercado de trabalho, organização do Sistema Único de Saúde, saúde coletiva, entre muitos outros,

são abordados por diferentes autores. A literatura disponível é enriquecida constantemente. O texto de Maria Elizabeth de Oliveira Urtiaga traz abordagens importantes que o salienta entre os demais, pela própria formação singular da autora: médica, especialista em Capacitação Docente em Medicina Geral, em Ciências Políticas, em Teoria e Técnica Psicanalítica Aplicada à Psicoterapia, desenvolve ainda projetos de extensão e ensino na área de Bioética. Ela aborda agora o estudo da subjetividade do professor de medicina e a relação dele com os seus alunos, em forma de livro...

Título	Adaptation and validation of the portuguese version of the lithium knowledge test (LKT) of bipolar patients treated with lithium: cross-over study
Autor(es)	ROSA, A.R. ANDREAZZA, A.C. GAZALLE, F.K SANCHEZ-MORENO, J. SANTIN, A. STEIN, Airton Tetelbon BARROS, H.M VIETA, E. KAPCZINSKI, F.
Publicado em	<i>Clinical Practice and Epidemiology Mental Health</i> , ano 2, n. 1, p.34, dec. 2006.
Resumo	Adherence problems are a common feature among bipolar patients. A recent study showed that lithium knowledge was the main difference between adherent and non adherents bipolar patients. The Lithium Knowledge Test (LKT), a brief questionnaire, was developed as a means of identifying aspects of patients practical and pharmacological knowledge which are important if therapy is to be safe and effective. The original English version is validated in psychiatric population, but a validated Portuguese one is not yet available. METHODS: One hundred six patients selected were diagnosed with bipolar disorder (I or II) according to DSM-IV criteria and had to be on lithium treatment for at least one month. The LKT was administered on only one occasion. We analysed the internal consistency, concurrent validity, sensitivity and specificity of the LKT for the detection of the knowledge about lithium treatment of bipolar patients. RESULTS: The internal consistency, evaluated by Cronbachs alpha was 0.596. The mean of total score LKT by bipolar patients was 9.0 (SD: 0.75) for men and 8.74 (SD: 0.44) for women. Concurrent validity based on serum lithium concentration showed a significant correlation between the total LKT score and plasma lithium ($r=0,232$; $p=0.020$). The sensitivity was 84% and specificity was 81%. CONCLUSION: LKT is a rapid, reliable instrument which appears to be as effective as a lengthier standard interview with a lithium clinic doctor, and which has a high level of acceptability to lithium patients. We found that the psychometric assessment of the Portuguese version of LKT showed good internal consistency, sensitivity and specificity.

Título	Analysis of dimensional bone growth restrictions with internal rigid fixation placed through areas of rapid bone growth
Autor(es)	CARDOSO, Eduardo Seixas CANÇADO, R.P. OLIVEIRA, Marília Gerhardt de LAMBERTS, M. HEITZ, Claiton
Publicado em	<i>Brazilian Oral Research</i> , São Paulo, n.20, p.18, 2006.

Título	Atenção à saúde do trabalhador no Grupo Hospitalar Conceição
Autor(es)	PEREIRA, Mônica Villela BORBA, Elza Maria Vernet de
Publicado em	<i>Revista Momento & Perspectivas em Saúde</i> , Porto Alegre, ano 18 n. 1, p.57-61, jan./jun. 2005.
Resumo	O objetivo deste trabalho é apresentar a Política de Saúde do Trabalhador do Grupo Hospitalar Conceição. Esta política baseia-se na integralidade da atenção, articulando as ações de assistência e recuperação com aquelas de prevenção de agravos e de controle de seus determinantes, através da intervenção nos ambientes e processos de trabalho. As ações de vigilância nos ambientes de trabalho buscam conhecer a realidade dos cotidianos de trabalho do Grupo Hospitalar Conceição para, em conjunto com os trabalhadores, planejar ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde.

Título	Avaliação cefalométrica lateral de indivíduos submetidos à expansão rápida maxilar assistida cirurgicamente
Autor(es)	MASSULO, R.C.E.S LIMA, Eduardo Martinelli Santana de HEITZ, Claiton FREITAS, M.P.
Publicado em	<i>Revista Clínica de Ortodontia Dental Press</i> , Maringá, n. 5, p.94-105, 2006.

Título	Avaliação da hepatotoxicidade dos antiretrovirais na co-infecção VHC/HIV
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de MATTOS, Ângelo Alves de SANTOS, Breno Riegel
Publicado em	<i>Revista AMRIGS</i> , Porto Alegre, n. 50, p.217-221, 2006.

Título	Avaliação da imunidade celular em pacientes co-infectados com o vírus da hepatite c (VHC) e da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de MATTOS, Ângelo Alves de SANTOS, Breno Riegel
Publicado em	<i>Gastroenterologia Endoscopia Digestiva</i> , São Paulo, ano 24, supl. 9, 2005.

Título	Avaliação da imunidade celular nos pacientes co-infectados pelo VHC e HIV
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de MATTOS, Ângelo Alves de SANTOS, Breno Riegel GALPERIM, Bruno
Publicado em	<i>Revista Arquivos de Gastroenterologia e Endoscopia Disgestiva</i> , ano 24, pag. 09,2005.

Título	Avaliação da precisão do posicionamento da maxila pela osteotomia le fort i
Autor(es)	PINTO, Lécio Pitombeira HEITZ, Claiton GLOCK, Luiz LIMA, Eduardo Martinelli Santana de
Publicado em	<i>Jornal Brasileiro de Ortodontia & Ortopedia Facial</i> . Curitiba, p.264-273, 2005.

Título	Avaliação mecânica e microscópica da laserterapia (830nm) no processo de distração osteogênica em mandíbula de ovelhas
Autor(es)	CERQUEIRA, A. GUIMARÃES, K.B BEZERRA, M.F SILVA, D.N. HEITZ, Claiton
Publicado em	<i>Brazilian Oral Research</i> , São Paulo, n.20, p.89, 2006.

Título	Biópsia de linfonodo-sentinela em câncer de mama - experiência pessoal
Autor(es)	BOFF, M.I. STEIN, Airton Tetelbon BOFF, R.A. CANCIAN, F.
Publicado em	<i>Revista AMRIGS</i> , n. 50, p.211-216, 2006.
Resumo	Objetivos: Avaliar o emprego da biópsia do linfonodo-sentinela em pacientes com câncer de mama em estágio inicial de uma clínica privada, analisando o índice de identificação do linfonodo-sentinela, o valor preditivo, a acurácia e o índice de complicações da técnica. Métodos: Foram analisados 173 prontuários de pacientes que foram submetidas à técnica da biópsia do linfonodo-sentinela no período entre setembro de 2001 e setembro de 2004. Resultados: Referente à curva de aprendizado (32 casos), o índice de identificação do linfonodo-sentinela foi de 90,6%, e o método apresentou um valor preditivo negativo de 95,4%, um valor preditivo positivo de 100% e uma acurácia de 96,5%. Considerando o total de 173 casos, os índices de identificação do linfonodo-sentinela e de com-

plicações foram, respectivamente, 98,2% e 2,3%. Conclusão: O estudo sugeriu que a Biopsia do Linfonodo Sentinela foi clinicamente útil, devido ao significativo índice de identificação do Linfonodo Sentinela e à baixa taxa de falso-negativo da curva de aprendizado, números que devem ser almejados pelos cirurgiões, para que possam substituir a linfadenectomia por tal técnica. A necessidade da experiência cirúrgica para o sucesso deste método é confirmada neste estudo pela mudança do índice de identificação de 90,6% na curva de aprendizado, para 98% quando consideradas todas as pacientes.

Título	Caseload of poisoning among children treated by the rio grande do sul state toxicology information center (CIT/RS), Brazil
Autor(es)	RAMOS, C.L. TARGRA, M.B. STEIN, Airton Tetelbon
Publicado em	<i>Cadernos de Saúde Publica</i> , São Paulo, ano 21, n. 4, p.1134-1141, jul./ago. 2005.
Resumo	This was an analytical, descriptive, cross-sectional study to establish the profile of poisonings among children 0 to 4 years of age reported to the Rio Grande do Sul State Toxicology Information Center (CIT/RS) in Porto Alegre, Brazil, 2003. A total of 1,311 cases were selected and data were extracted on children who had suffered individual accidental poisoning inside the home. From a systematic random sample of 286 patients, 21 interviews were held with the children's parents or guardians, using a structured instrument. The typical profile of poisoning featured: ≤ 1 year age bracket; male gender; oral exposure; poisonous agent located on living room or bedroom floor; furniture height < 30 cm; time of poisoning from 18:01 to 22:00; time between poisoning and search for emergency medical care less than 30 minutes; analgesics as poisonous agent; medical assessment of purported poisoning as non-toxic, evolving to cure. The data indicate relevant characteristics as to the time of poisoning and place where poisonous agents were located. Definition of a profile helps promote and expand childhood poisoning prevention campaigns by public health agencies.

Título	Cirurgia do transplante pancreático
Autor(es)	VITOLA, Santo Pascual GUERRA, Enilde Eloena DIDONÉ, Eduardo Chaise PIRES, Fabian Silva D'ÁVILA, André Ricardo
Publicado em	GARCIA, V.D; ABBUD FILHO, M; NEUMANN, J; PESTANA, J.O.M (orgs.). <i>Transplante de Órgãos e Tecidos</i> . Segmento Farma, n. 2, 2006, p.779-784.

Resumo	Técnica cirúrgica da preparação do enxerto, e do transplante pancreático com variações da drenagem venosa e drenagem da secreção exócrina.
---------------	--

Título	Cirurgia do transplante renal e suas complicações.
Autor(es)	GUERRA, Enilde Eloena DIDONÉ, Eduardo Chaise PIRES, Fabian Silva D'ÁVILA, André Ricardo VITOLA, Santo Pascual
Publicado em	GARCIA, V. D; ABBUD FILHO, M; NEUMANN, J; PESTANA, J.O.M (orgs.). <i>Transplante de Órgãos e Tecidos</i> . Segmento Farma, n. 2, 2006, p.408-426.
Resumo	Técnica cirúrgica de nefrectomia em doador vivo, do transplante renal e possibilidades terapêuticas das complicações vasculares, urinárias e de coleções perirenais.

Título	Complicações cirúrgicas do transplante pancreático
Autor (es)	GARCIA, Valter Duro VITOLA, Santo Pascual GUERRA, Enilde Eloena DIDONÉ, Eduardo Chaise PIRES, Fabian Silva D'ÁVILA, André Ricardo
Publicado em	GARCIA, V. D; ABBUD FILHO, M; NEUMANN, J; PESTANA, J.O.M (orgs.). <i>Transplante de Órgãos e Tecidos</i> . Segmento Farma, n. 2, 2006, p. 785-792.
Resumo	Abordagem das complicações do transplante de pâncreas em relação às várias técnicas e possibilidades terapêuticas.

Título	Condições de saúde bucal e qualidade de vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço de um Centro Hospitalar de Porto Alegre
Autor(es)	ARAÚJO, S.S.C. PADILHA, Dalva Maria BALDISSEROTTO, Julio

Publicado em | *Anais do III Congresso Saúde e Qualidade de Vida do Cone Leste Paulista*. São José dos Campos, p. 37-38, 2005.

Título	Correlation between drug treatment adherence and lithium treatment attitudes and knowledge by bipolar patients
Autor(es)	ROSA, A.R. MARCO, M. FACHEL, J.M. KAPCZINSKI, F. STEIN, Airton Tetelbon BARROS, H.M.
Publicado em	<i>Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry</i> . Oxford, n. 15, sep.2006.
Resumo	BACKGROUND: Non-adherence should always be investigated when there is a failure in bipolar treatments, since it is known that reported non-adherence rates in bipolar disorder treatment for long-term prophylactic pharmacotherapy range from 18% to 52%, with a median prevalence of 44.7%. Several factors are related to the poor adherence and reduction of medication efficiency, such as the different types of bipolar disorder, the presence of side effects, medication interactions, level of patient's knowledge about the disorder and their attitude towards treatment, complexity of medical regimens and the doctor-patient relationship. METHODS: Bipolar disorder outpatients under lithium treatment from the Hospital de Clinicas and Materno Infantil Presidente VARGAS of Porto Alegre were recruited. All the patients had bipolar disorder and gave informed consent to participate in a clinical interview (106), answered the Lithium Attitudes Questionnaire (LAQ), Lithium Knowledge Test (LKT), Medication Adherence Rating Scale (MARS) and had plasma and red blood cells lithium measurements to assess their medication adherence and the factors that influenced it. RESULTS: 85.6% of bipolar disorder were adherent to lithium treatment showing plasma lithium between 0.6 and 1.2 mmol/L. There was an inverted correlation between the total LAQ score with plasma and red blood cells, a positive correlation between LKT and MARS with plasma and red blood cell lithium. CONCLUSION: These results confirmed that knowledge level is directly correlated to treatment adherence and patients' attitudes, lower adherence, general opposition to prophylaxis, fear of side effects, denial of therapeutic effectiveness and illness severity.

Título	Crioglobulinemia mista em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C
Autor(es)	SOUZA, Andréa Ribeiro de TOVO, Cristiane Valle

	MATTOS, Ângelo Alves de ZARDIM, M.L. SILVA, S.C.
Publicado em	<i>Revista da AMRIGS</i> , Porto Alegre, ano 49, p.160-164, 2005.
Título	Desafios críticos dos recursos humanos em saúde: uma visão regional
Autor(es)	RIGOLI, Felix ROCHA, Cristianne Maria Famer FOSTER, Allison Annette
Publicado em	<i>Revista Latino-americana de Enfermagem</i> , São Paulo, ano 14, n.1, p.7-16, 2006.
Título	Diagnóstico de saúde do distrito leste de Porto Alegre/ Promed
Autor(es)	MORETTO, Alexandre MENDES, Jussara Maria R. AGUINSKY, Beatriz G. HARZHEIM, Erno SILVA, L.
Obra	MORETTO, Alexandre; MENDES, Jussara Maria R; AGUINSKY, Beatriz G.; HARZHEIM, E.; SILVA, L.. <i>Diagnóstico de saúde do Distrito Leste de Porto Alegre/PROMED</i> . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 272 p.
Resumo	O livro descreve pesquisa realizada por professores e alunos bolsistas da Faculdade de Medicina e Serviço Social da PUCRS entre 2003-2004. Os dados foram coletados através de bases de dados demográfico-epidemiológicos, questionários com usuários de serviços, grupos focais de trabalhadores de saúde e observação geográfico-ambiental da áreas de risco. Os resultados mostram a situação de morbi-mortalidade local relacionando-os com os demais indicadores de qualidade de vida, bem como com a disponibilidade de serviços de saúde. Foi realizado processo de geoprocessamento dos principais indicadores, com mapeamento das condições de saúde por microáreas homogêneas de risco, permitindo a adequada alocação de recursos e qualificação da rede de serviços e a inserção produtiva do ensino em saúde no SUS.

Título	Diretrizes e protocolos clínicos para o SUS: instrumentos para qualificação da assistência em saúde
Autor(es)	MORETTO, Alexandre STEIN, Airton Tetelbon POLANZINCZKI, C. A. SIRENA, Maria da Gloria Accioly KUCHENBECKER, Ricardo
Obra	MORETTO, Alexandre; STEIN, Airton Tetelbon; POLANZINCZKI, C. A; SIRENA, Maria da Glória Accioly.; KUCHENBECKER, Ricardo (Orgs.). <i>Diretrizes e protocolos clínicos para o SUS</i> . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 86 p.
Resumo	As Diretrizes Clínicas e Protocolos são apresentados como instrumentos de gestão e qualificação da assistência dentro do contexto próprio do Sistema Único de Saúde(SUS). Além de apresentar uma reflexão sobre o SUS e seus desafios, descreve a metodologia para selecionar evidências científicas em artigos científicos e construir algoritmos que organizam o fluxo de implementação de Diretrizes e Protocolos.

Título	Does co-occurring social phobia interfere with alcoholism treatment adherence and relapse?
Autor(es)	TERRA, M.B. BARROS, H.M STEIN, Airton Tetelbon FIGUEIRA, I. ATHAYDE, L.D. SPANEMBERG, L. POSSA, M. de Aguiar FILHO, L.D. SILVEIRA, D.X.
Publicado em	<i>Journal of Substance Abuse Treatment</i> , Nova Yorque, ano 31, n. 4, p.403-409, dec., 2006.
Resumo	This study investigates the impact of social phobia on adherence to and outcomes 6 months following standard alcohol treatment and Alcoholics Anonymous (AA) group meetings among alcohol-dependent patients with and without social phobia. In a cohort study, 300 detoxified alcohol-dependent individuals in Porto Alegre, Brazil, were interviewed during, as well as 3 and 6 months after hospital detoxification. At both follow-up points, treatment adherence was low and relapse rates were high among patients with and without social phobia, and no significant differences were seen between the two groups of

patients in relapse, adherence to AA, or adherence to psychotherapy. Findings from this sample suggest that although alcohol-dependent patients with social phobia showed a tendency for less adherence at AA and felt less integrated with their AA group, social phobia comorbidity was not a significant risk factor for alcohol use relapse or for nonadherence to AA or psychotherapy.

Título	Effect of intervention to improve breastfeeding technique on the frequency of exclusive breastfeeding and lactation-related problems
Autor(es)	OLIVEIRA, Luciana Dias de GIUGLIANI, Elsa Regina Justo SANTO, Lílian Córdova do Espírito FRANÇA, Maristela Cavalheiro Tamborindeguy WEIGERT, Enilda Maria Lara KOHLE, Celina Valderez Feijó BONILHA, Ana Lúcia De Lourenzi
Publicado em	<i>Journal of Human Lactation</i> , Charlottesville, ano 22, n. 3, p.315-321, 2006.
Resumo	This randomized clinical trial compared frequencies of exclusive breastfeeding and lactation-related problems during the first 30 days among 74 mothers who received a 30-minute counseling session on breastfeeding technique in the maternity ward, and 137 controls. The frequency of exclusive breastfeeding among mothers who had received intervention was similar to controls by 7 days (79.7% vs 82.5%, respectively) and 30 days (60.8% vs 53.3%). There was no difference between groups in the frequency of sore nipples at 7 and 30 days, in breast engorgement and mastitis, and in the quality of breastfeeding technique at 30 days. Therefore, a single intervention at maternity was not sufficient to improve breastfeeding technique, increase exclusive breastfeeding rates, and reduce the incidence of breastfeeding problems during the first month.

Título	Effects of the lactosorb1bioabsorbable plates on the craniofacial development of rabbits: direct morphometric analysis using linear measurements
Autor(es)	CANÇADO, R.P. CARDOSO, Eduardo Seixas BOURGUIGNON FILHO, A. M. BORGES, H.O.I. HEITZ, Claiton OLIVEIRA, Marília Gerhardt de

Publicado em	<i>International. Journal of Oral and Maxilofacial Surgery</i> , Copenhagen, n. 35, p.528-532, 2006.
Resumo	The use of plates for the treatment of fractures can affect craniofacial bone development. This study investigated the effect of bioabsorbable plates and titanium microscrews on the growth of the craniofacial skeleton of rabbits (<i>Oryctolagus cuniculus</i>), in the neonatal period. A LactoSorb1 plate and PROMM1 titanium microscrews were positioned across the coronal suture in animals in the study group. In the control group, only PROMM1 titanium microscrews were attached to the cranium. Anteroposterior linear measurements were obtained using 3 different gauging devices: digital precision caliper, EKG caliper and nylon string. Frontal-nasal (FN) distances were statistically different between the left and right side when the digital caliper ($P \leq 0.01$), EKG caliper ($P \leq 0.01$) and nylon string ($P \leq 0.05$) were used. Mean right-side FN distances in the control and study groups were significantly different ($P \leq 0.05$) when measured with the EKG caliper. Normal neonatal craniofacial growth of rabbits was affected by the use of bioabsorbable plates in this study. Further studies should be conducted to investigate whether these plates affect growth in human beings.

Título	Effectiveness of primary health care evaluated by a longitudinal ecological approach
Autor(es)	STEIN, Airton Tetelbon HARZHEIM, Erno
Publicado em	<i>Journal of Epidemiology and Community Health</i> , London, n. 60, p.3-4, 2006.
Resumo	The expansion of primary health care in Brazil is shaping the agenda for health care policy in the Latin American region. Brazil is the country with the third worst income distribution in the world and, as a consequence of the unequal distribution of its main determining factors—income, education, living conditions, sanitation, and health service ¹ —the health indicators also present broad inequalities by regions and social classes. Child health, because of greater vulnerability to risks and also to health protective factors, is a clear example of this iniquitous situation in Brazil. In 1999, the child mortality rate in the north eastern region of Brazil was 52.4/1000, while in the southern region it was 17.2/1000 live births. 2 A population based investigation performed in 1990–1991, in two cities in the north east ³ found 40% of avoidable deaths among the absolute total of children who died aged less than 1 year. One of the strategies of the Ministry of Health to develop the National Health System (SUS), bringing together effectiveness and equity, has been to extend the primary health care network through the Family Health Program (PSF, Programa Saúde da Família). The PSF intends to increase access to health care.

Título	Evaluation of quality of life and metabolic improvement after jejunoileal bypass in a community of low socioeconomic status
Autor(es)	SOUTO, K.E.P MEINHARDT, Nelson STEIN, Airton Tetelbon
Publicado em	<i>Obesity Surgery</i> , Oxford, ano 14, n. 6, p.823-828, Jun-Jul, 2004.
Resumo	Bariatric operations are currently the only effective treatment for morbid obesity. The first operation, jejunoileal bypass (JIB), has been superceded. However, JIB has left a heritage which must be followed. We report the long-term follow-up of a series of patients who had undergone JIB in south Brazil. METHODS: 49 super-obese patients (85% female) from a poor community were submitted to JIB from 1987 to 2001. 5 deaths occurred and 4 patients were lost during follow-up. Quality of life was evaluated by means of the Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) applied to 40 patients. RESULTS: Preoperatively, 11 patients (22.4%) were diabetic, 13 (26.5%) were dyslipidemic, and 23 (46.9%) had high blood pressure. After a mean postoperative period of 64.3 +/- 40.0 months, there was complete resolution of co-morbidities in all patients. Mean preoperative BMI was 52.8 +/- 10.3 kg/m(2), and the postoperative mean excess weight loss was 58.9% +/- 18.9%. CONCLUSION: JIB was adequate in reduction of weight, resolution of co-morbidities, and improvement in the quality of life as measured by BAROS. Since February 2001, we perform biliopancreatic diversion with duodenal switch, but we continue to follow our patients with JIB.

Título	Fibro-odontoma ameloblástico em terço médio de face
Autor(es)	VOLKWEIS, M.R. MOTTIN, R.W. RADOS, P.V. WAGNER, J.C.
Publicado em	<i>RGO</i> , v.54, n. 1, p.77-80, jan/mar 2006.

Título	Fixação rígida intra-óssea com parafuso compressivo “neck screw” nas fraturas do complexo zigomático
Autor(es)	HEITZ, Claiton FERREIRA, Alexey Gaspar Martins DIEFENBACH, Renata Sesti

Publicado em | *Revista Internacional de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial*, ano 3, p.172-176, 2005.

Título | **Futuro no tratamento do diabetes tipo 1**

Autor(es) | TSCHIEDEL, Balduino

Publicado em | LYRA, Ruy e CAVALCANTI, Ney (Orgs.). *Diabetes mellitus*. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2006, p.307-312.

Resumo | Desde o advento da insulina, na década de 1920 do século passado, muito progresso tem sido alcançado no campo da diabetologia. Particularmente nesta última década, com o surgimento das novas insulinas recombinantes, com a maior disseminação das bombas de insulina, em modelos tecnologicamente mais avançados e precisos e com a solidificação do conceito de tratamento intensivo, em que a monitorização da glicemia capilar deixou de ser uma utopia para tornar-se uma realidade, é que verificamos o quanto avançamos. Certamente os anos por vir nos apontarão caminhos ainda mais luminosos, principalmente a partir do momento em que novas terapias celulares estão despontando.

Título | **Hepatic outcomes after jejunioileal bypass: is there a publication bias?**

Autor(es) | MEINHARDT, Nelson
SOUTO, K.E.P
ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria
STEIN, Airton Tetelbon

Publicado em | *Obes Surg.* 2006 Sep;16(9):1171-8.
Class III Obesity Care Center, Porto Alegre, Brazil.

Resumo | BACKGROUND: One of the reasons why jejunioileal bypass (JIB) was abandoned were reports of liver failure. The aim of this study was to describe histological findings in the intraoperative and follow-up liver biopsies of a cohort of super-obese patients who had undergone JIB. METHODS: 50 consecutive patients underwent JIB. Samples of liver biopsies performed intraoperatively (41 patients) and in the follow-up (31 patients) were evaluated. Brunt's scale was used. RESULTS: Mean age at operation was 37.9 +/- 7.6 years, and 15 patients (30.6%) had diabetes type 2, 20 (40.8%) had dyslipidemia, 29 (59.2%) had high blood pressure, and one (0.5%) had hepatitis C. Mean BMI preoperatively was 52.8 +/- 7.5 kg/m(2). Mean follow-up time was 67.0 +/- 42.8 months. At the time of the latest liver biopsy, the mean BMI was 35.7 +/- 7.5 kg/m(2). The % excess weight loss (%EWL) was 62.4 +/- 20.0%. 8 deaths (16%) have occurred, none from liver-related complications. At liver biopsy during the JIB operation, NAFLD was confirmed in 36 patients (86.7%) and NASH in 13

(31.7%). In 25 patients with mean follow-up of 4.8 +/- 4.0 years, there was no statistically significant change in the liver histology regarding the extent of steatosis (P=0.20), steatohepatitis (P=0.74) and fibrosis (P=0.71).CONCLUSIONS: There was a significant metabolic improvement, maintenance of the %EWL, and no worsening of liver histology. There has possibly been a publication bias concerning liver outcomes, where the type of JIB and the concomitance of hepatitis C were not taken into account.

Título	Hepatites virais agudas e crônicas
Autor (es)	ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de
Publicado em	Pasqualotto A.C.; Schwarzbald, A.V. (Orgs.). <i>Doenças infecciosas – consulta rápida</i> . Porto Alegre, Artmed, p. 559-589, 2006.

Título	Gripe e resfriado: prevenção, diagnóstico, tratamento e complicações
Autor (es)	MATTOS, Luiz Felipe Cunha
Publicado em	PROMEF - Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade, módulo 1. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2006

Título	Impact of human immunodeficiency vírus (HIV) infection in patients infected with the hepatitis C vírus (HCV)
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle MATTOS, Ângelo Alves de SOUZA, Andréa Ribeiro de RIGO, Juliana Ferrari de Oliveira ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de SANTOS, Breno Riegel GALPERIM, Bruno
Publicado em	<i>Revista Liver International</i> (Online Early): 2006.

Título	Influência da técnica de amamentação nas frequências de aleitamento materno exclusivo e lesões mamilares no primeiro mês de lactação
Autor(es)	WEIGERT, Enilda Maria Lara GIUGLIANI, Elsa Regina Justo FRANÇA, Maristela Cavalheiro Tamborindeguy OLIVEIRA, Luciana Dias de BONILHA, Ana Lúcia De Lourenzi ESPIRÍTO SANTO, Lílian C. do KÖLER, Celina Valdez F.
Publicado em	<i>J Pediatr</i> (Rio J). 2005; 81(4): 310-6.
Resumo	Objetivo: Investigar a influencia da técnica de amamentação nas frequências de aleitamento materno exclusivo e de lesões mamilares no primeiro mês de lactação. Métodos: Foram pesquisados parâmetros desfavoráveis à amamentação (cinco relacionados ao posicionamento mãe/bebê três à pega do bebê) em 211 mães/bebês na maternidade e, aos 30 dias, no domicílio. Foram comparadas as frequências desses parâmetros entre as duplas com e sem amamentação exclusiva aos 7 e 30 dias, e entre as mães com e sem lesões mamilares na maternidade. Resultados: O número de parâmetros desfavoráveis na maternidade foi semelhante nas duplas com e sem amamentação exclusiva aos 7 e 30 dias. Porém, aos 30 dias, foi, em média, menor nas duplas em amamentação exclusiva, tanto no posicionamento ($1,7 \pm 1,2$ versus $2,2 \pm 1,1$; $p = 0,009$) quanto na pega ($1,0 \pm 0,6$ versus $1,4 \pm 0,6$; $p < 0,001$). O número de parâmetros desfavoráveis de pega na maternidade foi semelhante entre as mulheres com e sem lesão mamilar, porém as mulheres sem essa complicação apresentaram um número maior de parâmetros desfavoráveis de posicionamento ($2,0 \pm 1,4$ versus $1,4 \pm 1,2$; $p = 0,04$). Conclusões: As frequências de amamentação exclusiva no primeiro mês e de lesões mamilares não foram influenciadas pela técnica de amamentação na maternidade, mas houve associação entre melhor técnica aos 30 dias e prática da amamentação exclusiva. Novos estudos poderão elucidar se uma melhora da técnica ao longo do tempo seria responsável pela manutenção da amamentação exclusiva ou se a introdução de mamadeira exerceria efeito negativo na técnica.

Título	Internal consistency and reliability of primary care assessment tool (PCATool-brasil) for child health services
Autor(es)	HARZHEIM, ERNO STARFIELD, B. RAJMIL, L. ALVAREZ-DARDET, C. STEIN, Airton Tetelbon

Publicado em	<i>Caderno de Saúde Pública</i> . 2006, São Paulo, Aug;22(8):1649-59.
Resumo	Health strategies based on primary health care have been expanding in Brazil. An instrument applied to users, the Primary Care Assessment Tool (the PCATool), which measures the extent of primary care, has been validated in the United States. We sought to adapt the PCATool to Brazil and analyze its validation and reliability through a cross-sectional validation study of the Child PCATool. Validation included: translation, back-translation, adaptation, debriefing, content and construct validate, internal consistency, and reliability analysis. The questionnaire was applied to 468 parents or guardians of children registered with 18 primary health services in Porto Alegre, representing the services' normal pediatric population. Using factor analysis, 8 domains were identified, with Cronbach's aranging from 0.74 to 0.88. Validation resulted in a 45-item scale, divided into 8 attributes (Access to First Contact, Continuity, Coordination, 3 attributes of Comprehensiveness, Community Orientation, and Family Orientation). These results showed that the PCATool-Brasil has adequate validity and reliability and could be used as a national instrument to evaluate primary health care after its application to other population settings in the country.

Título	Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumours
Autor(es)	MEDEIROS, L.R. FACHEL, J.M. GARRY, R. STEIN, Airton Tetelbon
Publicado em	<i>Furness SCochrane Database Syst Rev</i> . Jul., 2005.
Resumo	BACKGROUND: Over the last ten years laparoscopy has become an increasingly common approach for the surgical removal of benign ovarian tumours. There remains uncertainty as to the value of this intervention. This review has been undertaken to assess the available evidence for the benefits and harms of laparoscopic surgery for benign ovarian tumours compared to laparotomy. OBJECTIVES: To determine the efficacy, safety and cost of laparoscopic surgery compared with laparotomy in women with ovarian tumours assumed to be benign. SEARCH STRATEGY: We searched electronic databases, trials registers and reference lists of published trial reports. Review articles were also searched. SELECTION CRITERIA: All randomised controlled trials comparing laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumours. DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Three reviewers independently assessed each study's eligibility and quality and extracted data. MAIN RESULTS: Six randomised controlled trials were identified involving 324 patients. Three subgroups of ovarian tumours were considered: any histological type of benign ovarian tumour, dermoid cysts and endometriomata. Surgical outcomes: The mean duration of surgery was longer in the laparoscopy group compared to the laparotomy group overall (WMD 11.39; 95% CI 0.57 to 22.22). However, heterogeneity was present with substantial inconsistency ($I(2)=87\%$) . The heterogeneity found in these analyses was likely to reflect differences in the

patient populations. Adverse effects of surgery: The pooled estimate for febrile morbidity decreased for laparoscopy compared to laparotomy (Peto OR 0.34; 95% CI 0.13 to 0.88). The odds of any adverse effect of surgery (total number of complications - surgical injury and/or post operative complications) were decreased after laparoscopic procedures (Peto OR 0.26; 95% CI 0.12 to 0.55). Short-term recovery: VAS pain scores favoured laparoscopy (WMD -2.36; 95% CI -2.07 to -2.03) and the odds of being pain free were significantly greater for the laparoscopy group compared to laparotomy (Peto OR 7.35; 95% CI 4.3 to 12.56). Mean length of hospital stay was shorter in the laparoscopy group with reduction 2.79 days (95% CI -2.95 to -2.62) compared to laparotomy. Economic outcomes: There was a significant reduction of US\$1045 (95% CI -1361 to -726.97) in the laparoscopy group compared to the laparotomy group in one trial of women with any type of benign ovarian tumour. **AUTHORS' CONCLUSIONS:** In women undergoing surgery for benign ovarian tumours, laparoscopy is associated with a reduction in the following; febrile morbidity, urinary tract infection, post operative complications, post operative pain, days in hospital and total cost. These findings should be interpreted with caution as only a small number of studies were identified including a total of only 324 women and not all of the important outcomes were reported in each study.

Título	Mentoplastia: do planejamento à técnica cirúrgica
Autor(es)	HEITZ, Claiton LIMA, Eduardo Martinelli Santana de ORSO, Vanderlê de Arlete PINTO, Lécio Pitombeira FERREIRA, Alexey Gaspar Martins
Publicado em	<i>Jornal brasileiro de Ortodontia & Ortopedia Facial</i> . Curitiba, v.10, p.29-35, 2005.

Título	Migración y “escasez” de enfermeras en América Latina: primeros apuntes
Autor(es)	MALVAREZ, Silvina ROCHA, Cristianne Maria Famer COMETTO, Maria Cristina GÓMEZ, Patricia Fabiana
Obra	MALVAREZ, Silvina; ROCHA, Cristianne Maria Famer; COMETTO, Maria Cristina; GÓMEZ, Patricia Fabiana (Orgs.). <i>Migración y “escasez” de enfermeras en América Latina: primeros apuntes</i> . Washington, DC: OPS/OMS, 2006.

Resumo

El presente informe intenta sistematizar la producción realizada en el II Simposio Panamericano de Investigación en Recursos Humanos de Enfermería desarrollado en Lima, Perú, en noviembre de 2004, dentro del IX Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. El mismo tuvo como marco los Lineamientos de Cooperación Técnica para el Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería de la OPS/OMS y se encuadró en los avances logrados por la línea de trabajo sobre Información, Conocimiento y Teoría para el Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería, ámbito de análisis y discusión de tendencias en la investigación. Los últimos diez años han representado para la enfermería de la Región una época histórica de cambios caracterizados por diversos desarrollos en el marco de la globalización y la reforma del sector salud. El campo de los recursos humanos de enfermería ha sido particularmente influido por esas tendencias con procesos simultáneos de transformación positiva en algunos aspectos y negativa en otros. En ese contexto, la investigación en enfermería aplicada al análisis de los recursos humanos está produciendo conocimientos de trascendencia necesarios para la reorganización de los servicios de salud. Sin embargo, estos avances no son lo bastante conocidos y compartidos y aparecen dispersos, a menudo pierden potencialidad. La Organización Panamericana de la Salud ha venido acompañando estos desarrollos y entiende que las mencionadas razones definen la necesidad de actualizar el proceso de estudio, de reflexión, análisis y sinergia en materia de investigación en recursos humanos de enfermería que permitan repensar el campo, apoyar progresos y contribuir a orientar rumbos. El término de la migración está asociado con la idea de viaje, al cambio de lugar, de trabajo y de vida, al pasaje de un país a otro, al pasaje de una región a otra, o sea, significa una mudanza. Por lo tanto, la migración es una movilidad espacial que envuelve la transferencia de la residencia de un determinado lugar para otro. Sin embargo según la definición de la ONU, esto solamente se trata de un cambio permanente de residencia, siendo de este modo excluido el deslucamiento de los visitantes, turistas y las personas que se trasladan de un lugar para otro de manera rutinaria. La introducción sobre el tema de la migración en el contexto de los enfermeros representa una llamada para la existencia de un programa de trabajo, el cual debería ser coordinado por la OPS/OMS, apuntando el fortalecimiento del liderazgo de estos profesionales para participar en los países del proceso político y, para la definición de las directrices que reglamentan la movilidad de los enfermeros. Los objetivos centrales del Simposio versaron sobre la socialización y discusión de las tendencias en investigación en recursos humanos de enfermería y la exploración conjunta del problema de la migración y escasez de enfermeras en América Latina e intentar sentar las bases para un estudio regional. La metodología utilizada fue reunir la información preliminar por país participante y confeccionar conclusiones preliminares que fueron presentadas en las actividades del Simposio y compartidas con todos los colegas de las diferentes regiones de las Américas. En este Informe están las problemáticas planteadas por los diferentes países en relación a la escasez y migración de las enfermeras en América Latina, esperando que el mismo permita a los países avanzar en el análisis de la situación de la enfermería, avizorar perspectivas y acordar lineamientos para el futuro.

Título	Monitoramento da adesão ao tratamento com Lítio
Autor(es)	ROSA, A.R. KAPCZINSKI, F. OLIVA, R. STEIN, Airtón Tetelbon BARROS, H.M.T.
Publicado em	<i>Revista Psiquiatria Clínica</i> . São Paulo, ano 33, v. 5, 249-261, 2006.
Resumo	Contexto: O lítio é utilizado como medicamento de escolha para o tratamento dos transtornos de humor bipolar. Mostra-se eficaz em reduzir as crises maníacas e depressivas do transtorno do humor bipolar, além de exercer efeito anti-suicida. No entanto, a efetividade do lítio é comprometida pela baixa adesão ao tratamento, por sua vez influenciada por características dos pacientes e pelas características farmacológicas do lítio, que dificultam seu uso. Objetivo: Revisar alguns aspectos farmacológicos clínicos do lítio e sua importância para a monitorização terapêutica do lítio, por meio de dosagens e de escalas de auto-relato em português para avaliar a falta de adesão ao lítio. Método: Foi realizada revisão da literatura básica e clínica sobre lítio disponível em artigos científicos em língua inglesa e portuguesa acessados pelo PUBMED e SCIELO, usando as palavras "lítio", "monitoramento", "cooperação" OU "adesão". Resultados: O lítio é um fármaco de muito baixo índice terapêutico e farmacocinética muito individual, fato que justifica a necessidade de monitorização terapêutica intensiva, por meio de determinação da concentração sérica e hemática. As taxas de adesão ao lítio em pacientes brasileiros que freqüentam os ambulatórios específicos para transtornos bipolares estão entre 60 e 85%, sendo mais elevadas que a de pacientes tratados sem acompanhamento psicoeducativo (adesão em torno de 46%). Os pacientes não aderentes apresentavam um menor nível de conhecimento sobre o lítio e sobre a doença, e mais atitudes negativas dos pacientes ao uso de medicamentos, além de receio dos efeitos adversos. Conclusão: A monitorização laboratorial e por escalas auxilia na adesão ao tratamento, por auxiliar na individualização terapêutica e ajuste de doses de lítio, além de detectar as interações medicamentosas e as atitudes dos pacientes em relação a sua doença e tratamentos.

Título	Morphometric analysis of the effects of lactosorb bioabsorbable plates on the craniofacial growth of rabbits using computed
Autor(es)	CANÇADO, R.P. CARDOSO, Eduardo Seixas BOURGUIGNON FILHO, A. M. BORGES, H.O.I. OLIVEIRA, Marília Gerhardt de HEITZ, Claiton

Publicado em | *Journal of Materials Science. Materials in Medicine.* EUA, v.17, p.945-948, 2006.

Título | **Mudanças na microbiologia da peritonite bacteriana espontânea**

Autor(es) | ALMEIDA, PAULO ROBERTO LEIRIAS DE
TOVO, Cristiane Valle
GALPERIM, Bruno
ARENZ, Maximiliano Maurell
CAMARGO, Nutianne

Publicado em | *Gastroenterologia Endoscopia Digestiva*, São Paulo, ano 24, p.35, 2005.

Título | **Obesity and gestational weight gain: cesarean delivery and labor complications**

Autor(es) | SELIGMAN, Luiz Carlos
DUNCAN, Bruce Bartholow
BRANCHTEIN, Leandro
GAIO, Dea Suzana Miranda
MENGUE, Sotero Serrate
SCHMIDT, Maria Inês

Publicado em | *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 457-465, Jun. 2006.

Resumo | OBJETIVO: Avaliar a associação de obesidade pré-gestacional e ganho de peso excessivo com cesariana e outras complicações do parto. MÉTODOS: Um total de 4.486 mulheres com 20-28 semanas de gravidez do pré-natal geral do Sistema Único de Saúde de seis capitais brasileiras foram arroladas entre 1991-1995 e seguidas até o parto. As categorias do índice de massa corporal e o ganho de peso total foram calculados com base no peso pré-gestacional. Associações entre estas categorias nutricionais e complicações do parto foram ajustadas por regressão logística. RESULTADOS: A obesidade foi observada em 308 (6,9%) pacientes. As cesarianas ocorreram em 164 (53,2%) obesas, 407 (43,1%) pré-obesas, 1.045 (35,1%) normais e em 64 (24,5%) mulheres de baixo peso. O risco relativo para cesariana na comparação de obesas com grávidas de peso normal foi 1,8 (IC 95%: 1.5-2.0). Ganho de peso excessivo mostrou a maior associação com cesariana entre obesas (RR=2,2; IC 95%: 1,4-3,2) para 4o vs 2o quartil. Maior peso pré-gravídico esteve associado com risco ajustado significativamente aumentado para mecônio no parto vaginal e com prematuridade, morte perinatal ou infecção na cesariana. Similar-

mente, grande ganho de peso aumentou o risco para mecônio e hemorragia materna no parto vaginal e com prematuridade na cesariana. **CONCLUSÕES:** A obesidade pré-gestacional e o ganho de peso excessivo aumentaram de forma independente o risco de cesariana e vários resultados adversos durante o parto vaginal. Esses achados oferecem evidências adicionais aos efeitos negativos da obesidade pré-gravídica e do ganho de peso excessivo na gravidez e parto.

Título	O Componente Imaterial do Trabalho em Saúde
Autor(es)	FAJARDO, Ananyr Porto
Publicado em	<i>Anais do VII Congresso Nacional da Rede Unida</i> . Curitiba, 2006.
Resumo	A qualidade e a natureza do trabalho em saúde vem mudando ao incorporar espaços de ensino, de aprendizagem e de pesquisa ao exercício da assistência. A Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (RIS/GHC) é desenvolvida em equipe multiprofissional e em serviço com assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais contratados que exercem preceptoria junto aos residentes dessa modalidade de aperfeiçoamento especializado, além de suas atividades técnicas específicas. Passaram, assim, a produzir formalmente serviços e conhecimento, caracterizando o componente imaterial de seu trabalho. O contexto no qual o processo de ensino, aprendizagem e pesquisa é desenvolvido em um ambiente de produção coletiva de saúde contempla um componente imaterial em seu trabalho baseado no modo de lidar com relações, saberes, poderes e práticas interdisciplinares na busca de encontros produtores de saúde, tendo como referência que trabalhar, pensar, fazer, ensinar e aprender são práticas simultâneas. É possível promover a superação da dicotomia entre cuidar, ensinar, aprender e pesquisar em saúde ao proporcionar o reconhecimento do componente imaterial do trabalho na produção coletiva organizada de conhecimento.

Título	O efeito da redução de peso no risco cardiovascular em uma unidade básica de saúde
Autor(es)	RAMOS, A.M. STEIN, AIRTON TETELBON WOLF, M.L. MAY-BRITT, Heyer SCHWARZBACH, J.
Publicado em	<i>Revista AMRIGS</i> , Porto Alegre (RS), v. 49, n. 2, p.100-104, 2005.

Título	O lugar da escrita na cultura de imagem
Autor(es)	MEIRA, Ana Cláudia Santos DAL PRÁ, Alexandra Libardi VILLAS-BÔAS, Diego COSTA, Jonas Untertriefallner SEIBEL, Heloisa Pio de Almeida DE ANDRÉ, Katy FERRAZ, Paulo Fernando Monteiro SCHARDONG, Sandra Cristina MORAIS, Suzana Assis Brasil
Publicado em:	<i>Revista da Sociedade de Psicologia</i> do RS, ano. 4, n. 1, p.53-61, jun. 2005.
Resumo	Este trabalho apresenta uma reflexão crítica acerca do lugar que o processo de escrever ocupa numa cultura que valoriza em demasia a imagem. Na sociedade pós-moderna, a mídia incentiva a superficialidade, o consumismo e a competição. Assim, processos mais elaborados, como o sentir e o pensar, são deixados em segundo plano. Nesta linha, a leitura e, especialmente, a escrita, vão perdendo espaço, já que vêm na contramão da rapidez com que nos acostumamos a viver no dia-a-dia. Escrever demora mais e exige um exercício mental mais profundo, mas é extremamente necessário para que não percamos nossa individualidade, nossa criatividade, nossa capacidade de introspecção, de análise cuidadosa e de síntese dos fatos.

Título	Os 50 anos do Hospital Cristo Redentor – memória, história e política no Grupo Hospitalar Conceição.
Autor(es)	AMORETTI, Rogério
Publicado em	MINISTÉRIO DA SAÚDE. Grupo Hospitalar Conceição. <i>Os 50 anos do Hospital Cristo Redentor</i> . Porto Alegre, 2006.
Resumo	O aniversário de 50 anos do Hospital Cristo Redentor, em 2006, nos dá a oportunidade de comemorar suas realizações e lembrar a trajetória institucional. Sendo o primogênito entre os quatro hospitais do Grupo Conceição e o caçula - Serviço de Saúde Comunitária, com seus 12 postos da rede de atenção primária -, o Hospital Cristo Redentor trouxe consigo, desde a origem, os sonhos, as esperanças e as incertezas de toda e qualquer iniciativa fundante. É a partir deste contexto de relatos escutados, de informações de jornais e de raros textos escritos que deixo minhas impressões que trazem também as lembranças de experiências vividas, acumuladas em 30 anos de trabalho no Grupo Hospitalar Conceição e que me colocaram, por ocasião destas comemorações e festividades do aniversário de 50 anos, na condição privilegiada de Diretor Técnico da instituição.

Título	O “veto familiar” em transplantes de órgãos
Autor(es)	ÁVILA, Gustavo Noroña de GAUER, Gabriel José Chittó ÁVILA, Gerson Antônio de
Publicado em	<i>Anais do IV Bioética Sul</i> . Porto Alegre, v.1, ano 2005 p. 32 <i>Revista Eletrônica da Sociedade Rio-Grandense de Bioética</i> , Porto Alegre, v.1, 2005, p. 1-6.
Resumo	Após o conturbado dispositivo da Lei 9.434/97, que introduziu a doação de órgãos presumida em nosso país, outra medida governamental mostra-se como entrave à transplantação. Trata-se do chamado “veto familiar”, introduzido pela Lei 10.211/2001, que entregou a escolha da disposição dos órgãos aos familiares. Tal regramento demonstra, de forma inequívoca, a extrema dificuldade que o Poder Público vêm demonstrando no tratamento deste assunto. Isto significa que, em ultima análise, ainda que o sujeito manifeste em vida sua inequívoca vontade de dispor de seus órgãos (exemplo: consignando em cartório), quando da sobrevivência de sua morte, se houver negativa da família, aqueles não serão doados. Além da manifesta contrariedade aos desejos do descendente, há um claro desperdício de órgãos em uma permanente situação de escassez. Neste espectro, uma questão fundamental emerge: Existem direitos das pessoas sobre seus corpos mesmo após o evento morte? Segundo Rita de Cássia Turvo Leite, o cadáver é objeto de um direito privado não-patrimonial, de origens consuetudinárias, que tem por conteúdo a faculdade de determinar o modo e a forma de seu destino normal. Este destino, ao que nos parece, deve ser escolhido de acordo com as convicções da pessoa morta, seja para realizar ou rechaçar a doação de órgãos. Deve-se, então, verificar o que foi manifestado em vida, não só pelo número de beneficiados com os órgãos mas, principalmente, em respeito ao defunto. A vontade de quem não mais é, mas, ainda assim, pode fazer com quem alguém continue a ser, deve ser preservada.

Título	Perfil dos pacientes com carcinoma hepatocelular em um hospital geral de Porto Alegre – RS
Autor(es)	GALPERIM, Bruno TOVO, Cristiane Valle ARENZ, Maximiliano Maurell SCHNEIDER, N.C. DAMO, D.F. VIEGAS, Ana Cláudia B. ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de
Publicado em	<i>GED - Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva</i> , São Paulo, ano 24, Supl. 29, 2005.

Título	Perspectivas no uso de ácido hialurônico no tratamento de doenças articulares degenerativas
Autor(es)	VOLKWEIS, M.R. GOMES, J.P. WAGNER, J.C.
Publicado em	<i>Revista Internacional de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial</i> , v. 4, n. 13, p. 91-96, jan./mar. 2006.

Título	Planejamento familiar e aborto: algumas problematizações
Autor(es)	GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima MEDEIROS, Patrícia NARDINI, Milena WILHEMS, Daniela Montano VECCHIA, Liana Della
Publicado em	<i>Anais do VII Seminário Internacional Fazendo Gênero - Gênero e Preconceitos</i> . Florianópolis, 2006 Disponível em: http://www.fazendogenero7.ufsc.br/st_11.html
Resumo	No Brasil, as políticas de Atenção à Saúde da Mulher são propostas e desenvolvidas pelo Ministério da Saúde através do SUS e têm sido tomadas como prioridade governamental. Este trabalho tem por objetivo a análise do documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” – PNAISM – no que tange as questões sobre o Planejamento Familiar. Busca-se levantar quais ações relativas às Políticas de Atenção à Saúde da Mulher de um hospital geral público de Porto Alegre têm sido desenvolvidas em relação ao planejamento familiar, e a correlação destas com a estimativa de aborto neste território. A partir disso, objetiva-se contribuir com dados para uma sistematização das ações desenvolvidas nesse serviço, visando expandir e qualificar a atuação na área da saúde da mulher. A análise sobre as estratégias do PNAISM quanto ao Planejamento Familiar indicam que a temática do aborto não está incluída, o que acaba restringindo os serviços dentro destas Políticas Públicas.

Título	Preditores laboratoriais de atividade inflamatória e de fibrose hepática em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle VIEGAS, Ana Cláudia B. DAMO, D.F.

	ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de GALPERIM, Bruno LANTZ, Fábio ARENZ, Maximiliano Maurell SCHNEIDER, N.C.
Publicado em	<i>GED - Gastroenterologia Endoscopia Digestiva</i> , São Paulo, ano 24, p. 87, 2005.

Título	Prevalência ambulatorial em um hospital geral de marcadores para hepatites B e C em pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	TOVO, Cristiane Valle SANTOS, Diogo Edele dos MATTOS, Ângelo Zambam de ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de MATTOS, Ângelo Alves de SANTOS, Breno Riegel
Publicado em	<i>Revista Arquivos de Gastroenterologia</i> 2006, São Paulo, ano 43, p.73-76, 2006.

Título	Prevalence of hepatitis C virus in alcoholic patients: role of parenteral risk factors
Autor(es)	GALPERIM, Bruno CHEINQUER, H. STEIN, Airton Tetelbon FONSECA, A. LUNGE, V. IKUTA, N.
Publicado em	<i>Revista Arquivos de Gastroenterologia</i> , São Paulo, ano 43, n.2, p.81-84, 2006.
Resumo	The prevalence of hepatitis C virus (HCV) infection is elevated in alcoholic patients, but the risk factors are unclear. The role of parenteral risk factors are indeterminated in this population. AIMS: To determine the prevalence of hepatitis C virus infection in alcoholic patients admitted to a detoxification unit and to evaluate the presence of underlying parenteral risk factors. METHODS: A total of 114 consecutive unselected alcoholic patients admitted to a single chemical dependency unit during 14 month were included. Epidemiological data and

history of parenteral risk factors for hepatitis C virus infection were obtained with a standardized questionnaire. Blood was collected for determination of aminotransferases and anti-hepatitis C virus antibodies (ELISA-3). Positive samples were confirmed by polymerase chain reaction and tested for genotype. RESULTS: Among the 114 alcoholics, 17 (15%) were anti-hepatitis C virus positive. Of these, 12 (71%) had detectable serum HCV-RNA by PCR. Genotype 1 was found in six cases and genotype 3 in five (one patient was undetermined). Forty-nine (43%) patients had elevated serum ALT and/or AST at baseline. The comparison between the 17 positive and the 97 negative patients showed significant differences in mean serum ALT levels (42 $\pm$ 41 IU/L vs. 22 $\pm$ 20 IU/L), rate of elevated ALT (65% vs. 34%), and presence of parenteral risk factors (94% vs. 10%). Comparison between alcoholic patients with and without elevated aminotransferases showed significant difference only in the rate of positive anti-hepatitis C virus antibodies (24% vs. 7%). Furthermore, among the 17 anti-hepatitis C virus positive patients, the rate of detectable HCV-RNA was significantly higher in the 12 with elevated aminotransferases versus the 5 with normal aminotransferases (92% vs. 20%). CONCLUSIONS: There was a high prevalence of anti-hepatitis C virus antibodies in alcoholics and the majority was confirmed by the presence of detectable HCV-RNA. Intravenous drug use was the main risk factor for hepatitis C virus infection in this population.

Título	Prevalence of retinopathy in caucasian type 2 diabetic patients from the south of brazil and relationship with clinical and metabolic factors
Autor(es)	SANTOS, K.G. TSCHIEDEL, Balduino SCHNEIDER, J.R. SOUTO, K.E.P. ROISENBERG, I.
Publicado em	<i>Brazilian Journal of Medical and Biological Research</i> , Ribeirão Preto, v. 38, n.2, p.221-225, fev. 2005.
Resumo	Diabetic retinopathy (DR) is a sight-threatening chronic complication of diabetes mellitus and is the leading cause of acquired blindness in adults. In this cross-sectional study, we investigated the prevalence of the factors associated with DR in an analysis of 210 consecutive and unrelated Brazilian Caucasians with type 2 diabetes mellitus. Retinopathy was evaluated by ophthalmoscopy and/or biomicroscopy through dilated pupils. The relationship between clinical and metabolic variables and the presence of DR was assessed by logistic regression analysis. DR was detected in 99 of the 210 patients (47 percent). In the univariate logistic regression analysis, male sex, duration of diabetes, body mass index, glyated hemoglobin, C-peptide, LDL cholesterol, smoking, and albumin excretion rate were found to be associated with the presence of DR. However, the multiple logistic regression analysis showed that only duration of diabetes (odds ratio (OR)=1.15, 95 percent CI=1.09-1.22; P < 0.001), glyated

hemoglobin (OR=1.21, 95 percent CI=1.01-1.46; P=0.047) and albumin excretion rate > 100 pg/min (OR=12.72, 95 percent CI=3.89-41.56; P < 0.001) were independently associated with DR. Although DR was found to be frequent among Brazilian type 2 diabetic patients, its prevalence was within the range observed in other Caucasian populations. Our findings emphasize the need for good glycemic control in order to prevent or delay the onset of DR, since the most well-known risk factors for the development of this complication in type 2 diabetes mellitus, such as duration of diabetes, glycated hemoglobin and albumin excretion rate were independently related to DR.

Título	Psiquiatria social contemporânea – narrativa de uma trajetória clínica
Autor(es)	ZIEGELMANN, Luiz
Obra	ZIEGELMANN, Luiz. <i>Psiquiatria Social Contemporânea: Narrativa de uma trajetória clínica</i> . São Paulo: Vozes, 2005.
Resumo	O livro, <i>Psiquiatria Social Contemporânea</i>, é a narrativa de uma trajetória clínica, em que a experiência do vivido em diferentes cenários de práticas em saúde somada a busca do autor por outras referências teóricas capazes de dar alguma sustentação para aquilo que ia experimentando na práxis, vai possibilitar a formulação de uma proposta de clínica em saúde mental que não toma o sofrimento psíquico como algo natural e individual mas sim a partir de sua produção social. Esta trajetória do médico é experimentada de diferentes formas, desde o estranhamento ao lidar com uma realidade nunca habitada antes, ao trabalhar como médico comunitário numa vila popular muito carente, assim como a sua surpresa ao se deparar com a clínica psiquiátrica hospitalar voltada basicamente para o diagnóstico e a prescrição de psicofármacos. Foram surgindo vários questionamentos e também tensionamentos entre aqueles conhecimentos adquiridos durante a formação médica e aquilo que a realidade e a prática lhe ensinavam no cotidiano do trabalho profissional. Ambas experiências, comunitária e hospitalar, exigiam do autor um outro olhar e um repensar dos diferentes aspectos que envolvem a formação médica, mas principalmente as ferramentas teóricas necessárias para operar uma outra clínica, que considera a condição humana na sua complexidade, a partir da sua diversidade e dos seus diferentes vetores existenciais. Uma clínica compromissada com a construção de uma outra lógica social e da própria vida e não uma clínica empenhada apenas em responder aos sintomas e patologias numa abordagem individual e desconectada das inquietações e angústias do viver contemporâneo. A construção desta clínica, coloca para o autor a necessidade de se apropriar de conceitos teóricos muito além daquilo que é reservado ao saber médico e psiquiátrico mais tradicional, como são os conceitos de genealogia, vontade de potência, lutas de poder e autopoiese de Nietzsche, Foucault, Maturana e Varela, respectivamente. Talvez aqui esteja, provavelmente, o maior esforço e desafio do autor, o de agrupar e compor algumas redes de pensamento de cunho mais filosófico e social para a construção de uma outra perspectiva da clínica em saúde mental. O livro coloca em discussão a clínica e a possibilidade de se provocar um outro modo de fazê-la, numa

perspectiva mais ética e poética da construção de outros modos de existência diante de potências ou forças, que contém e sufocam a subjetividade para um viver mais livre, afetuoso e digno. Esse outro modo de fazer a clínica, no livro aparece em destaque o modo grupal ou clínica grupal. O livro traz alguns fragmentos vivos dessa clínica com grupos, possibilitando uma idéia melhor de como vai se processando essa clínica diante das diferentes situações em análise, onde através dos diferentes atravessamentos e criações que o grupo permite, vai se desenhando aquilo que o autor se refere como a busca de uma nova filosofia do viver.

Título	Quality and effectiveness of different approaches to primary care delivery in Brazil
Autor(es)	HARZHEIM, Erno DUNCAN, Bruce Bartholow STEIN, Airton Tetelbon CUNHA, C.R. GONÇALVES, M.R. TRINDADE, T.G. OLIVEIRA, M.M. PINTO, M.E.
Publicado em	<i>BMC Health Serv Res.</i> Dec 5;6(1):156, 2006.
Resumo	Since 1994, Brazil has developed a primary care system based on multidisciplinary teams which include not only a physician and a nurse, but also 4-6 lay community health workers. This system now consists of 26,650 teams, covering 46% of the Brazilian population. Yet relatively few investigations have examined its effectiveness, especially in contrast with that of the traditional multi-specialty physician team approach it is replacing, or that of other existing family medicine approaches placing less emphasis on lay community health workers. Primary health care can be defined through its domains of access to first contact, longitudinality, coordination, comprehensiveness, community orientation and family orientation. These attributes can be ascertained via instruments such as the Primary Care Assessment Tool (PCATool), and correlated with the effectiveness of care. The objectives of our study are to validate the adult version of this instrument in Portuguese, identify the extent (quality) of primary care present in different models of primary care services, and correlate this extent with measures of process and outcomes in patients with diabetes, hypertension and coronary heart disease (CHD). Methods / Design We are conducting a population-based cross-sectional study of primary care in the municipality of Porto Alegre. We will interview a random sample totaling 3000 adults residing in geographic areas covered by four distinct models of primary care of the Brazilian national health system or, alternatively, by one nationally prominent complementary health care service, as well as the physicians and nurses of the health teams of these services. Interviews query perceived quality of care (PCATool-Adult Version), patient satisfaction, and process indicators of management of diabetes, hypertension and known CHD.

We are measuring blood pressure, anthropometrics and, in adults with known diabetes, glycated hemoglobin. DISCUSSION: We hope to contribute not only by validating the PCATool-Adult Version for use in Brazil, but also by furnishing ample data concerning the appropriate mix of health care professionals in the primary care team, a question of international import. Once validated, future use of this instrument should help direct advances aiming at improving the quality of primary care in Brazil.

Título	Remoção de múltiplos órgãos abdominais
Autor(es)	DIDONÉ, Eduardo Chaise GUERRA, Enilde Eloena PIRES, Fabian Silva D'ÁVILA, André Ricardo VITOLA, Santo Pascual
Publicado em	GARCIA, V. D; ABBUD FILHO, M; NEUMANN, J; PESTANA, J.O.M (orgs.). <i>Transplante de Órgãos e Tecidos</i> . Segmento Farma, n. 2, 2006, p.128-137.
Resumo	Descrição da avaliação e técnica cirúrgica de dissecação e abordagem para retirada de órgãos abdominais de doador cadáver .

Título	Residência Integrada em Saúde do GHC: Integração entre profissionais e âmbitos de atenção
Autor(es)	FAJARDO, Ananyr Porto BALDISSEROTTO, Julio SCHMIDT, Maria Helena PASINI, Vera Lucia
Publicado em	<i>Anais do VII Congresso Nacional da Rede Unida</i> . Curitiba, 2006.
Resumo	O Grupo Hospitalar Conceição instituiu a Residência Integrada em Saúde (RIS/ GHC) para assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais nas áreas de ênfase em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Mental e Terapia Intensiva. Circulam entre os âmbitos de atenção primária, secundária e terciária, vivenciando o SUS de forma ampliada. Promove a formação em serviço em equipe interdisciplinar enfatizando integralidade, universalidade e equidade na atenção à saúde, superando limites corporativos e o foco na assistência. Oportuniza a vivência dos processos de ensino, aprendizagem e pesquisa relevantes para o SUS, qualificando a atenção à saúde graças à agregação das ciências sociais e humanas à formação nesse campo. A reflexão teórica é realizada por campo e núcleo de atuação, além do Currículo Integrado, modalidade de formação baseada na compreensão da realidade e na construção coletiva do

conhecimento. A RIS/GHC provocou mudanças qualitativas e quantitativas na instituição e constitui uma oportunidade de reflexão para os envolvidos com as atividades de ensino e aprendizagem, oportuniza educação permanente para os trabalhadores da instituição e qualifica a atenção prestada.

Título	Relationship of p22phox c242t polymorphism with nephropathy in type 2 diabetic patients
Autor(es)	SANTOS, K.G. CANANI, L.H. GROSS, J.L. TSCHIEDEL, Balduino SOUTO, K.E.P ROISENBERG, I.
Publicado em	<i>Journal of Nephrology</i> , Milano, v. 18, n. 6, p. 733-738, 2005.
Resumo	In this case-control study, we investigated the possible involvement of the p22phox C242T polymorphism in the development and progression of diabetic nephropathy (DN) in 535 Caucasian Brazilians with type 2 diabetes. We also evaluated the effects of the interaction of the C242T polymorphism with smoking and hypercholesterolemia on the susceptibility to nephropathy. Genotype analysis was performed using polymerase chain reaction (PCR) followed by digestion with restriction enzyme. Logistic regression analysis was used to control for independent risk factors associated with nephropathy. The genotype frequencies in patients with overt DN (CC/CT/TT: 0.36/0.47/0.17) were not significantly different from those of diabetic individuals with normoalbuminuria (0.47/0.41/0.12) or microalbuminuria (0.42/0.48/0.10) ($p=0.214$). Likewise, there were no differences in the T allele frequency among patients with normoalbuminuria, microalbuminuria or overt DN (0.33, 0.34 and 0.40, respectively; $p=0.111$). However, the T allele was found to be more frequent among smokers with overt nephropathy (macroalbuminuria and/or in dialysis) than those who had normoalbuminuria (43 vs. 32%, $p=0.045$). The multiple logistic regression analysis confirmed that the CT+TT genotypes were independently associated with a higher risk of having overt nephropathy among smokers [odds ratio (OR)=6.76, 95% confidence interval (95% CI) 1.83-25.02]. Our study shows a gene-environment interaction associated with the increased risk of DN progression in Caucasian Brazilian smokers with type 2 diabetes.

Título	Reparo videolaparoscópico em pacientes com úlcera péptica perforada
Autor(es)	GOMES, Fábio da Silva GUERRA, Enilde Eloena

Publicado em	<i>Revista Brasileira de Videocirurgia</i> , Rio de Janeiro, 3(2):87-96, abr./jun. 2005.
Resumo	Revisão de dados da literatura que possam fundamentar a utilização de correção videolaparoscópica nos pacientes com úlcera péptica perforada. O tratamento da doença ulcerosa péptica sofreu diversas modificações e com melhor conhecimento dos fatores etiológicos e dos medicamentos comprovadamente eficazes, o papel da cirurgia ficou restrito às complicações. O reparo videolaparoscópico das úlceras pépticas perforadas vem sendo estudado desde o início dos anos 90, com resultados controversos e os dados apresentados pelos trabalhos necessitam de análise criteriosa para aplicação clínica.

Título	Retrobulbar hemorrhage: a case report
Autor(es)	MACHADO, R.A. SILVEIRA, R.L. BORGES, H.O.I. FILHO, A.M.B. OLIVEIRA, Marília Gerhardt de
Publicado em	<i>The Journal of Contemporary Dental Practice</i> , EUA, v. 7, n. 2, May 1, p.130-136, 2006
Resumo	Retrobulbar hemorrhage is a rare complication that may occur after mid-face injuries or following soft and hard tissue surgery around the eyes. The cardinal signs and symptoms of retrobulbar hemorrhage are pain, diplopia, ophthalmoplegia, a progression of increasing proptosis, and decreasing visual acuity leading to blindness. The diagnosis can be confirmed with computed tomography (CT) of the orbit or with ocular ultrasound. These diagnostic images are also important to define the size of the hematoma. This report describes a traumatic retrobulbar hemorrhage. In this case there were no signs of acute visual loss, and conservative treatment was possible without surgical intervention.

Título	Revisão sistemática sobre aspectos metodológicos das pesquisas em atenção primária no Brasil
Autor(es)	HARZHEIM, Erno STEIN, Airton Tetelbon DARDET, Carlos Alvares CANTERO, Maria Teresa Ruiz KRUSE, Cristine Kist VIDAL, Tiago Barra NAVA, Tiago Rodrigues
Publicado em	<i>Revista AMRIGS</i> , Porto Alegre (RS), v. 49, p. 248-252, 2005.

Título	Rheumatoid arthritis: evidence6 for bone loss in premenopausal women
Autor(es)	TOURINHO, T.F. STEIN, Airton Tetelbon CASTRO, J.A. BRENOL, J.C.
Publicado em	<i>Journal of Rheumatology</i> , Toronto, Canadá, v. 32 n.6 p.1020-1025, 2005
Resumo	To assess bone mineral density (BMD) status in patients with rheumatoid arthritis (RA). METHODS: Rheumatoid factor-positive premenopausal women with RA meeting the American College of Rheumatology criteria were enrolled. Exclusion criteria included diseases or drugs that affect BMD, except for glucocorticoids, and smoking. Evaluation consisted of a questionnaire, physical examination, and laboratory tests. Lumbar spine and right proximal femur BMD were measured with a DPX-Lunar DEXA scanner. Data were analyzed by Student t test, chi-square, and multivariate analysis. RESULTS: We studied 78 patients with RA and 39 controls; 82% were Caucasian, with mean age 35.5 +/- 6.7 years, and mean disease duration 48 +/- 51 months. Among patients, 74.4% had been treated with glucocorticoids, with a mean daily dose of 9.7 +/- 5.9 mg. Mean lumbar spine BMD was 1.157 +/- 0.124 g/cm2 in the RA patients, and 1.223 +/- 0.147 g/cm2 in controls (p < 0.01). Mean right proximal femur BMD did not differ significantly. Lumbar spine osteopenia correlated with "no physical activity at work" status, low body weight, and duration of glucocorticoid therapy. Femoral neck osteopenia correlated with "no physical activity at work" status, Steinbrocker class III, erosions of the hands, and high erythrocyte sedimentation rate (ESR). Trochanteric osteopenia correlated with "no physical activity at work" status, erosions on hand radiographs, low body weight, high ESR, and anemia. CONCLUSION: Patients with RA of relatively short disease duration already exhibited significantly lower lumbar spine BMD. The identification of prognostic markers for bone loss in patients with RA should not only prompt early therapeutic intervention, but also facilitate early preventive measures.

Título	Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição - RIS/GHC: uma estratégia de desenvolvimento de trabalhadores para o SUS
Autor(es)	BALDISSEROTTO, JULIO FAJARDO, Ananyr Porto PASINI, Vera Lucia SCHMIDT, Maria Helena AZEREDO, N. MARTINS, A.R. SILVEIRA, C.B.

Publicado em	AMORETTI, Rogério Ministério da Saúde. DEGES/SEGETES. <i>Residência Multiprofissional em Saúde: experiências, avanços e desafios</i> . Brasília, 2006, p.355-373.
Resumo	O presente artigo apresenta a RIS/GHC, programa de Residência Multiprofissional desenvolvido no Grupo Hospitalar Conceição, complexo de atenção à saúde da região sul do Brasil que conta em sua estrutura com serviços de diferentes níveis de atenção. A RIS/GHC foi constituída em 2004 e está organizada em três áreas de ênfase - Saúde da Família e Comunidade, Saúde Mental e Terapia Intensiva. Contando com a participação de profissionais de enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional, busca provocar a experiência de abertura recíproca e de comunicação entre conhecimentos, de modo a constituir um plano inter/transdisciplinar que se impõe pela troca sistemática e contínua entre saberes, assim como pela construção coletiva de novos conhecimentos.

Título	Sarcoidose induzida por tratamento com interferon peguilado para hepatite C crônica: relato de caso
Autor(es)	GALPERIM, BRUNO DAMO, D.F. VIEGAS, ANA CLÁUDIA B. ARENZ, MAXIMILIANO MAURELL TOVO, Cristiane Valle SCHNEIDER, N.C. ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de
Publicado em	<i>Gastroenterologia e edoscopia Digestiva (GED)</i> , São Paulo, ano 24 p.263-266, 2005.

Título	Short segmente barrett's esophagus and distal gastric intestinal metaplasia
Autor(es)	DIETZ, Judite CHAVES E SILVA, Sílvia MEURER, Luíse SEKINE, Setsuo SOUZA, Andréa Ribeiro de MEINE, Gilmara Coelho
Publicado em	<i>Arquivo Gastroenterologia</i> , EUA, ano 43, n. 2, p.117-119, abr./jun. 2006.

Título	Social anxiety disorder in 300 patients hospitalized for alcoholism in brazil: high prevalence and undertreatment
Autor(es)	TERRA, M.B. BARROS, H.M. STEIN, AIRTON TETELBON FIGUEIRA, I. JORGE, M.R. PALERMO, L.H. ATHAYDE, L.D. GONÇALVES, M.S. SPANEMBERG, L. POSSA, M. de Aguiar DARUY FILHO, L. DA SILVEIRA, D.X.
Publicado em	<i>Compr Psychiatry</i> . 47(6):463-7, nov./dec., 2006.
Resumo	Although the frequency of social phobia is high among alcoholic patients, this anxiety disorder is often neglected because treatment tends to be focused exclusively on alcohol dependence. METHODS: A total of 300 hospitalized alcoholic patients were interviewed using Structured Clinical Interview for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition and Liebowitz Social Anxiety Scale as well a questionnaire to check the use of medication for social phobia among alcoholics and the relationship between social phobia and alcohol use. RESULTS: A prevalence of 30.6% was found for specific phobia, 24.7% for social phobia, 22.2% for anxiety disorder induced by alcohol, 19.3% for generalized anxiety disorder, 5% for obsessive-compulsive disorder, 4.6% for posttraumatic stress disorder, and 2% for panic disorder with agoraphobia. Social phobia preceded alcohol dependence in 90.2% of the patients. The frequency of the use of medication for social phobia among social phobic alcoholics was 20.3%. CONCLUSIONS: The study confirms the high prevalence of anxiety disorders among alcoholics, particularly of social phobia. It also suggests that social phobia precedes alcohol dependence but shows that the use of medication for social phobia is still infrequent. Further studies are required to check if the failure to identify this comorbidity can make the recovery of alcoholics even more difficult.

Título	Suporte social, promoção de saúde e saúde bucal na população idosa no Brasil
Autor(es)	ARAÚJO, S.S.C. FREIRE, D.B.L. PADILHA, Dalva Maria BALDISSEROTTO, Julio

Publicado em	<i>Interface</i> (UNI/UNESP), v. 10, 2006, p.203-216.
Resumo	O crescente envelhecimento da população mundial, inclusive no Brasil, ressalta a importância de medidas para lidar com esta situação. No Brasil, a maioria dos idosos é do sexo feminino, vive em domicílios multigeracionais, é referência econômica nos mesmos, é de baixo nível sócio-econômico, portador de pelo menos uma doença crônica, independente para realização das atividades da vida diária, não tem dentes, não possui plano de saúde privado. Estas condições materiais adversas tornam os idosos mais expostos a situações de vulnerabilidade social, interferindo diretamente no processo saúde-doença através de seus determinantes sociais. O Suporte Social inclui políticas e redes de apoio social, que atuam como agente de integração do idoso na sociedade e minimizando os riscos de exclusão social e conseqüentemente de danos à sua saúde através de medidas de Promoção de Saúde. Este artigo aborda aspectos do Suporte Social em idosos brasileiros e sua relação com a Promoção de Saúde Sistêmica e Saúde Bucal.

Título	The european-specific mitochondrial cluster j/t could confer na increased risk of insulin-resistance and type 2 Diabetes: na analysis of the m.4216t > c and m.4917a < g variants
Autor(es)	CRISPIM, D. CANANI, L.H. GROSS, J.L. TSCHIEDEL, Balduino SOUTO, K.E.P. ROISENBERG, I.
Publicado em	<i>Annals of Human Genetics</i> , London, v. 70, n. 4, p.488-495, jul. 2006.
Resumo	The aims of this study were to investigate the contributions of the mitochondrial DNA m.4216T > C and m.4917A > G variants, and also of the European-specific mitochondrial cluster J/T, to the development of type 2 diabetes mellitus in Caucasian-Brazilian patients from Southern Brazil. We analyzed 347 type 2 diabetes patients and 350 control subjects. Variant frequencies in patients and control subjects were compared using chi2 tests or odds ratio. We also compared clinical and laboratory characteristics among patients with and without the variants. We found that the frequencies of the m.4216T > C and m.4917A > G variants are higher in diabetic patients than in control subjects. Moreover, haplogroups J (partially defined by the presence of the m.4216T > C variant only) and T (partially defined by the presence of both m.4216T > C and m.4917A > G variants) are more frequent in the type 2 diabetic group than in the control group. Patients belonging to the cluster J/T are more insulin resistant than patients of other haplogroups. In conclusion, our results indicate the association of the cluster J/T (as suggested by analyses of the m.4216T > C and m.4917A > G variants) with insulin resistance and type 2 diabetes.

Título	The g1888a variant in the mitochondrial 16s rrna gene may be associated with type 2 Diabetes in caucasian-brazilian patients from southern Brazil
Autor(es)	CRISPIM, D. CANANI, L.H. GROSS, J.L. CARLESSI, R.M. TSCHIEDEL, Balduino SOUTO, K.E.P. ROISENBERG, I.
Publicado em	<i>Diabetic Medicine</i> , Chichester, GB, v. 22, n. 12, p.1683-1689, dec. 2005.
Resumo	To compare the frequencies of the G1888A variant in the mitochondrial 16S rRNA gene between patients with Type 2 diabetes and non-diabetic control subjects from southern Brazil. We analysed 520 Type 2 diabetic patients (389 Caucasian- and 131 African-Brazilians) and 530 control subjects (400 Caucasian- and 130 African-Brazilians). DNA samples were amplified by polymerase chain reaction and digested with the RsaI enzyme. Variant frequency in patients and control subjects was compared using chi2 test, Fisher's exact test or odds ratio test. We also investigated the frequency of the G1888A variant in a subgroup of the patients with a maternal history of Type 2 diabetes plus two or more features of maternally inherited diabetes and deafness. The 1888A allele does not seem to be associated with Type 2 diabetes in African-Brazilians (frequency of 3.8% in patients and 0.8% in control subjects; PFisher=0.213). However, in Caucasian-Brazilians, the 1888A allele was significantly associated with diabetes (12.3% in patients vs. 3.5% in control subjects; OR=3.881; 95% CI 2.106-7.164; P<0.001) and also with higher levels of insulin resistance. The majority of the patients carrying the 1888A allele did not have clinical features of maternally inherited diabetes and deafness. CONCLUSION: The present study indicates the association of the mitochondrial G1888A variant with Type 2 diabetes and insulin resistance in Caucasian-Brazilian patients from southern Brazil.

Título	Transplante de pâncreas
Autor(es)	GUERRA, Enilde Eloena DIDONÉ, Eduardo Chaise
Publicado em	ROHDE, Luiz (Org.). <i>Rotinas em Cirurgia Digestiva</i> . Porto Alegre: Artmed, 2005.
Resumo	Capítulo de livro sobre aspectos básicos gerais de transplante de pâncreas: descrição sobre as modalidades do transplante de pâncreas, indicações, contra-indicações, técnica cirúrgica de retirada e implante do enxerto com diversas variações, imunossupressão e complicações.

Título	Tratamento da hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) com interferon ?-2b e ribavirina em pacientes co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Autor(es)	RIGO, Juliana Ferrari de Oliveira TOVO, Cristiane Valle MATTOS, Ângelo Alves de
Publicado em	<i>Revista eletrônica GED – Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva</i> , São Paulo, ano 24, supl. 91, 2005.

Título	Trauma associado com uso de álcool em idosos
Autor(es)	RIGO, Julio Cesar RIGO, Juliana Ferrari de Oliveira FARIA, Breno César STEIN, Airton Tetelbon SANTOS, Vitorino Modesto dos
Publicado em	<i>Brasília Médica</i> , Brasília (DF), v. 42, n. 1/2, p. 35-40, 2005.

Título	Tumor de células granulares brônquico, bilateral, associado a adenocarcinoma
Autor(es)	ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria FACHIN, F.F. ALMEIDA, E.A.
Publicado em	<i>Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial</i> , Rio de Janeiro, v. 41, n.3, p.144, 2005.

Título	Uso de retalho livre de fíbula no complexo bucomaxilofacial – relato e dois casos
Autor(es)	CHEM, R.C. WAGNER, J.C. VOLKWEIS, M.R. VALENTE, D.S. GRANDI, G.

Publicado em | *Revista de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial* , v. 5, n.4, p. 23-30 - 2005.

Título	Valor preditivo da resposta virológica precoce no retratamento com peg-ifn 2^a (pegasys) associado a ribavirina com ou sem amantadina em pacientes com hepatite crônica c recidivantes à terapia prévia com ifn associado à ribavirina
Autor(es)	PARANÁ, R. PARISE, E. LACERDA, M. CORREIA, S. COUTINHO, A. TEIXEIRA, R. SETTE, H. COELHO-BORGES, S. TOVO, Cristiane Valle SILVA, G. ROCHA, M. LORENÇO, R. SINHOR, A. TATSCH, F.
Publicado em	<i>Revista eletrônica GED- Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva</i> , São Paulo, ano 24, Supl. 81, 2005.



GHC

Grupo Hospitalar Conceição



ORDEM E PROGRESSO

ÍNDICE DE AUTORES

Índice de autores

A

ACHÊ, B. 51
AGUINSKY, Beatriz G. 68
ALMEIDA, E.A. 97
ALMEIDA, Paulo Roberto Leirias de
17, 18, 31, 38, 39, 46, 47, 53, 74, 80, 83, 85, 93
ALVAREZ-DARDET, C. 75
ALVES, Ângelo 42
AMORETTI, Rogério 58, 60, 82, 93
ANDREAZZA, A.C. 61
ANTUNES, Maria Cristina 22
ARAÚJO, E.S. 20, 42, 52
ARAÚJO, S.S.C. 22, 66, 94
ARENZ, Maximiliano Maurell
31, 38, 40, 46, 80, 83, 85, 93
ATHAYDE, L.D. 69, 94
AUER, Annella 34
AUGUSTIN, Andrea Camelia 27, 44, 45
ÁVILA, Gerson Antônio de 32, 37, 83
ÁVILA, Gustavo Noroña de 32, 37, 83
AZAMBUJA, Fernando 13, 14, 21, 33, 36, 53
AZEREDO, N. 92

B

BAES, Wilma 24
BAGOLIN, Eduardo Ilha 23
BALDINI, Vanessa Mendes 23
BALDISSEROTTO, C. 57, 58
BALDISSEROTTO, Julio
18, 22, 43, 44, 57, 58, 66, 89, 92, 94
BARRETO, Danyella Silva 43
BARRETO, E.R.S. 41
BARROS, H.M. 61, 67, 69, 79, 94
BASSOLS, João Vicente 42, 52
BERTONI, Simone Faoro 24
BEZERRA, M.F. 19, 64
BOFF, M.I. 64
BOFF, R.A. 64
BONATTO, T. 14
BONILHA, Ana Lúcia De Lourenzi 70, 75
BORBA, Elza Maria Vernet de 23, 62
BORGES, H.O.I. 70, 79, 91
BOURGUIGNON FILHO, A. M. 70, 79
BOZETTI, M.C. 57
BRANCHTEIN, Leandro 80
BRENOL, J.C. 92

C

CAMARGO, Nutianne 31, 80
CAMPOS, M.A. 13, 14, 21, 26, 33, 36, 53
CANANI, L.H. 90, 95, 96
CANÇADO, R.P. 14, 62, 70, 79
CANCIAN, F. 64
CANTERO, Maria Teresa Ruiz 91
CARBALLO, M.T. 57
CARDOSO, Eduardo Seixas 14, 62, 70, 79
CARELLI, Leonardo F. 17, 18, 20, 21, 30, 39
CARLESSI, R.M. 96
CARLSON, Vivian 19
CARPENA, M.P. 13, 14, 21, 26, 34, 36, 53
CARTELL, A.S. 59
CASTRO, A.C. 41
CASTRO, J.A. 92
CASTRO, Rodrigo Caprio Leite de 28
CERQUEIRA, A. 19, 64
CESAR, Julio 52
CHAVES E SILVA, Sílvia 93
CHEINQUER, H. 85
CHEM, R.C. 97
CIDADE, Renata Dotto 23
CIVARDI, Katia Augusta 19
COELHO-BORGES, S. 98
COMETTO, Maria Cristina 50, 77
CORREIA, S. 98
COSTA, Félix Giambastiani da 17
COSTA, Jonas Untertriefallner 37, 82
COSTA, M.A.P. 19
COSTA, M.B.G. 51
COSTENARO, F. 13, 14, 21, 26, 34, 36, 53
COUTINHO, A. 98
CRISPIM, D. 95, 96
CUNHA, C.R. 88
CURRA, Leda Dias 28
CUSIN, T. 26

D

DAL POZZO, Anderson 17, 18, 20, 21, 30, 39
DAL PRÁ, Alexandra Libardi 37, 82
DALAROSA, M.G. 49
DAMO, D.F. 38, 39, 46, 83, 84, 93
DARDET, Carlos Alvares 91
DARUY FILHO, L. 94
DÁVILA, André Ricardo 65, 66, 89

DAZEVEDO, Pedro Alves 41
DE ANDRÉ, Katy 82
DIDONÉ, Eduardo Chaise 65, 66, 89, 96
DIEFENBACH, Renata Sesti 72
DIEHL, J. 14
DIERCKS, Margarita 31
DIETZ, Judite 93
DUARTE, Elizabeth R. 18, 29, 50
DUNCAN, Bruce Bartholow 80, 88

E

EDELWEISS, M.I. 57
ESPÍNDOLA, Leonardo A. 17, 18, 20, 21, 30, 39
ESPINOSA, Sérgio 17, 20, 21, 30
ESPIRÍTO SANTO, Lílian C. do 75

F

FABRÍCIO, Blau 30, 39
FACHEL, J.M. 67, 76
FACHIN, F.F. 97
FAJARDO, Ananyr Porto 33, 43, 44, 81, 89, 92
FARIA, Breno César 97
FELDENS, L. 20, 42, 52
FENNER, A. 20, 42, 52
FERNANDES, Carmen 28
FERNANDES, Leonardo 24
FERRAZ, Paulo Fernando Monteiro 37, 82
FERREIRA, Alexey Gaspar Martins 72, 77
FERREIRA, J. 41
FIGUEIRA, I. 69, 94
FILHO, A.M.B. 91
FILHO, L.D. 69
FILHO, P.P. 50
FILHO, V.H.J. 19
FLORES, Rui 17, 25, 29
FONSECA, A. 85
FONTES, Edimara Pires de Lima 48
FOSTER, Allison Annette 35, 68
FRANÇA, Maristela Cavalheiro Tamborindeguy 70, 75
FREIRE, D.B.L. 94
FREITAS, Fernanda 31
FREITAS, M.P. 62
FUNK, Camila Sâmara 18

G

GAIO, Dea Suzana Miranda 80
GALPERIM, Bruno
19, 31, 38, 40, 46, 63, 74, 80, 83, 85, 93
GARCIA, Valter Duro 66

GARRY, R. 76
GAUER, Gabriel José Chittó 32, 37, 83
GAUER, Ruth Maria Chittó 32
GAZALLE, F.K. 61
GERLOFF, K. R. 49
GIUGLIANI, Elsa Regina Justo 70, 75
GLOCK, Luiz 64
GOBBI, Adriana Silveira 36
GODUE, Charles 34
GOLBERT, Airtón 13, 14, 21, 33, 36, 53
GOLDSTEIN, H.F. 59
GOMES, Fábio da Silva 90
GOMES, J.P. 84
GÓMEZ, Patricia Fabiana 50, 77
GONÇALVES, Iracema Cunha R.
13, 14, 21, 33, 36, 53
GONÇALVES, M.R. 88
GONÇALVES, M.S. 94
GORNISKI, Inara Lock 48
GOTTSCHELL, C.A.M. 27
GRANDI, G. 97
GROSS, J.L. 90, 95, 96
GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima 31, 39, 40, 84
GUERRA, Enilde Eloena 65, 66, 89, 90, 96
GUIMARÃES, K.B. 19, 64

H

HARZHEIM, Erno 68, 71, 75, 88, 91
HEITZ, Claiton 14, 19, 25, 62, 64, 70, 72, 77, 79

I

IKUTA, N. 85

J

JORGE, M.R. 94

K

KAPCZINSKI, F. 61, 67, 79
KICH, Mônica 48
KLIEMANN, L.M. 59
KOHLE, Celina Valderez Feijó 70
KÖLER, Celina Valderez F. 75
KONZEN, Adelaide Lucia 48
KOPITKE, Luciane 26
KÖRTING, Hévia 49
KRUSE, Cristine Kist 91
KUCHENBECKER, Ricardo 69
KULCZYNSKI, R. 20

L

LACERDA, M. 98
LAMBERTS, M. 14, 62
LANGONI, Paulo Oscar de Oliveira 17
LANTZ, Fábio 40, 85
LEITE, Wanda 31
LENZ, Maria Lucia Medeiros 16, 25, 28, 29
LEONARDI, Teresa Barato 13
LIMA, André Klafke de 43
LIMA, E.J. P. 51
LIMA, Eduardo Martinelli Santana de 62, 64, 77
LIMA, Maite 24
LORENÇO, R. 98
LUNGE, V. 85
LUZ, Patrícia de Oliveira 14

M

MACHADO, Alexandra 24
MACHADO, R.A. 91
MACIEL, Ana Lúcia da Costa 24
MAEDA, Fabio Kunihiro 25
MALVAREZ, Silvina 50, 77
MARCO, M. 67
MARTINS, A.R. 92
MASSULO, R.C.E.S 62
MATTOS, Ângelo Alves de
16, 17, 18, 52, 53, 63, 68, 74, 85, 97
MATTOS, Ângelo Zambam de 17, 18, 52, 53, 63, 85
MATTOS, Luiz Felipe Cunha 74
MAY-BRITT, Heyer 22, 81
MEDEIROS, L.R. 57, 76
MEDEIROS, Patrícia 31, 39, 40, 84
MEINE, Gilmar Coelho 93
MEINHARDT, Nelson 72, 73
MEIRA, Ana Cláudia Santos 23, 35, 36, 82
MELO, Leônilson Gaião de 25
MENDES, Aderlaine 31
MENDES, Jussara Maria R. 68
MENEZES, Marcelo Oliveira de 16, 17
MENGUE, Sotero Serrate 80
MEURER, Luíse 57, 93
MICHELS, Raquel 24
MIRANDA, A.B. 49
MOLINARI, Alberto Salgueiro
13, 14, 21, 33, 36, 38, 53
MOLINARI, D.F. 21, 34, 36, 38
MORAES, Luis Eduardo da Rosa 48
MORAIS, Suzana Assis Brasil 82
MORETTO, Alexandre 68, 69
MOTTIN, R.W. 72
MOUSQUER, D. 14

N

NARDINI, Milena 31, 39, 40, 84
NAVA, Tiago Rodrigues 91
NEGELISKII, Christian 22
NEVES, Fátima Delurjan Ferreira 17
NICOLETTI, Alite 42
NUNES, Fernanda Crespo 19
NUNES, P.C. 20

O

OLIVA, R. 79
OLIVEIRA, A.L.I. 57, 58
OLIVEIRA, C. 14
OLIVEIRA, Luciana Dias de 70, 75
OLIVEIRA, M.M. 88
OLIVEIRA, Maria Eunice 41, 51
OLIVEIRA, Marília Gerhardt de 14, 25, 62, 70, 79, 91
OLIVEIRA, P.J.A.Q. 51
ORSO, Vanderlê de Arlete 77

P

PACHECO, A. 41
PACHECO, I.A. 41
PADILHA, Dalva Maria 18, 22, 66, 94
PADILHA, Leni 25, 53
PALERMO, L.H. 94
PARANÁ, R. 98
PARISE, E. 98
PASINI, Vera Lucia 43, 44, 89, 92
PEKELMAN, Renata 24
PEREIRA, Adriana de Souza 24, 42
PEREIRA, Mônica Villela 23, 62
PERUZZO, Anaelí Brandelli 13, 22
PICCININI, Glaci 48
PIGNONES, Rosane 22
PIMENTEL, Pedro 17, 20, 21, 30, 39
PINTO, Lécio Pitombeira 64, 77
PINTO, M.E. 88
PIRES, Fabian Silva 65, 66, 89
PIRES, Norma Vieira 25, 28, 29
POHLMANN, P.R. 57
POLANZINCZKI, C. A. 69
PORCHER, Raquel de Castilhos 25, 53
POSSA, Lisiane Boer 23
POSSA, M. de Aguiar 69, 94
PUGA, L.S. 49

Q

QUADROS, Alexandre Schaan de 27, 44, 45

R

RADOS, P.V. 72
RAJMIL, L. 75
RAMOS, A.M. 38, 81
RAMOS, Aline de Ávila 48
RAMOS, C.L. 65
RATHKE, Cézár 48
RAUPP, Bárbara 25, 53
RÉUS, Deise Rocha 24, 26, 53
REY, Nei A. 20, 30, 39
RIBOLDI, G. 41
RIGO, Juliana Ferrari de Oliveira 74, 97
RIGO, Julio Cesar 52, 97
RIGOLI, Felix 35, 68
ROCHA, Cristianne Maria Famer
34, 35, 47, 50, 51, 68, 77
ROCHA, M. 98
ROCHA, M.P. 41
ROISENBERG, I. 86, 90, 95, 96
ROMAN, L. 41
ROMBALDI, Alfeu 17, 20, 21, 30, 39
RÖPKE, Marcos 31
ROSA, A.R. 61, 67, 79
ROSA, D.D. 57
ROSA, Jesaias Goulart 48
ROSALES, Carlos 51
ROSSA, Irma 51

S

SANCHEZ-MORENO, J. 61
SANTIN, A. 61
SANTO, Lílian Córdova do Espírito 70
SANTOS, Breno Riegel 19, 63, 74, 85
SANTOS, Débora Santos dos 21
SANTOS, Diogo Edele dos 18, 53, 63, 85
SANTOS, K.G. 86, 90
SANTOS, R.P. 41
SANTOS, Vitorino Modesto dos 97
SANTROVISTCH, Cátia Silvana de Lima 24, 53
SARMENTO-LEITE, Rogério E. G. 27, 44, 45
SASSI, André Petraglia 43
SCHARDONG, Sandra Cristina 82
SCHMIDT, Maria Helena 15, 43, 44, 89, 92
SCHMIDT, Maria Inês 80
SCHNEIDER, J.R. 86
SCHNEIDER, N.C. 38, 40, 47, 83, 85, 93
SCHWARZBACH, J. 81
SEGURA, E.S. 41, 51
SEIBEL, Heloisa Pio de Almeida 37, 82

SEKINE, Setsuo 93
SELIGMAN, Luiz Carlos 80
SETTE, H. 98
SIANTZ, Mary Lou de León 50
SILVA, Ana Maria Marques da 25
SILVA, D.N. 19, 64
SILVA, G. 98
SILVA, L. 68
SILVA, P.S.G. 20, 42, 52
SILVA, S.C. 68
SILVEIRA, C.B. 92
SILVEIRA, D.X. 69, 94
SILVEIRA, Naiani 24
SILVEIRA, R.L. 91
SINHOR, A. 98
SIQUEIRA, D.R. 13, 14, 21, 26, 34, 36, 53
SIRENA, Maria da Gloria Accioly 69
SORDI, Silvana 25, 53
SOUTO, K.E.P. 72, 73, 86, 90, 95, 96
SOUZA, Andréa Ribeiro de 42, 67, 74, 93
SOUZA, Blau Fabrício de 20
SOUZA, Joao Carlos Ketzer 42
SOUZA, João Carlos Ketzer de 52
SPANEMBERG, L. 69, 94
SPEGGIORIN, Silvana Emília 15
SPOLIDORO, M. 14
STARFIELD, B. 75
STEFFENS, Adriana 42
STEIN, Airtton Tetelbon
29, 41, 50, 51, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 72,
73, 75, 76, 79, 81, 85, 88, 91, 92, 94, 97
STEINHORST, Ana Maria Pasquali
17, 18, 20, 21, 29, 30, 38

T

TARGRA, M.B. 65
TATSCH, F. 98
TAVARES, M.R.G. 19
TEDESCO, Janaina dos Reis 24, 53
TEIXEIRA, R. 98
TELO, Shana Vieira 22, 42
TERRA, M.B. 69, 94
TIERLING, Vera Lúcia 26
TOURINHO, T.F. 92
TOVO, Cristiane Valle
16, 17, 18, 31, 38, 39, 42, 46, 52, 53,
63, 67, 74, 80, 83, 84, 85, 93, 97, 98
TRAMONTINI, Silvia Justo 22
TRINDADE, T.G. 88
TSCHIEDEL, Balduino 13, 59, 73, 86, 90, 95, 96
TURK, Vivian 32

U

ULBRICH-KULCZYNSKI, Jane Maria
20, 47, 59, 73, 93, 97
URTIAGA, Maria Elizabeth 60

V

VALENTE, D.S. 97
VARGAS, Tatiane Moreira de 23
VECCHIA, Liana Della 31, 39, 40, 84
VIDAL, Tiago Barra 91
VIEGAS, Ana Cláudia B. 38, 39, 46, 83, 84, 93
VIEIRA, S.B.B. 19
VIETA, E. 61
VILLAS-BÔAS, Diego 82
VITOLA, Santo Pascual 65, 66, 89
VOLKWEIS, M.R. 72, 84, 97

W

WAGNER, J.C. 72, 84, 97
WEIGERT, Enilda Maria Lara 70, 75
WERMUTH, Sinara Isabel 42
WILHEMS, Daniela Montano 22, 31, 39, 40, 84
WITTKE, Estefania I. 17, 18, 20, 21, 29, 30, 38
WOLF, M.L. 81

Z

ZARDIM, M.L. 68
ZELMANOWICZ, A. 57
ZIEGELMANN, Luiz 60, 87
ZILLI, Henrique Gheno 24, 53

Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP/GHC)

Gerência

Julio Baldisserotto	Gerente
Luiz Ziegelmann	Coordenador
Julio Roberto Hocsmann	Médico
Claudete Bittencourt	Assistente de Gerência
Lélio Santos da Silva	Técnico Administrativo

Ensino e Capacitação

Enilde Guerra	Assistente de Coordenação
Raul Pruinelli	Assistente de Coordenação (COREME)
Vera Lúcia Pasini	Coordenação RIS/GHC
Ananyr Porto Fajardo	Odontóloga
Maria Helena Schmidt	Enfermeira (Convênios e Estágios)
Airton Tetelbom Stein	Médico (Diretrizes Clínicas/Protocolos Assistenciais)
Angélica Aguiar	Técnico Administrativo
Maria Augusta R. de Oliveira	Técnico Administrativo
Geraldo Leandro Vasques Mandicaju	Auxiliar Administrativo
Iury dos Santos Machado	Auxiliar Administrativo
Lucas Willig Quadros	Auxiliar Administrativo

Pesquisa

Lauro Luiz Hagemann	Assistente de Coordenação
Alexandre Moretto	Médico
Abrahão Assein Arus Neto	Supervisor Administrativo
João Marcelo Pacheco	Técnico Administrativo
Rogério Farias Bitencourt	Auxiliar Técnico-Administrativo

Projetos

Cristianne Maria Famer Rocha	Assistente de Coordenação
Joacir Talasca	Técnico Especializado
Sergio Pacheco Ruschel	Técnico Especializado

Centro de Documentação

Izabel Alves Merlo	Assistente de Coordenação
Luciane Berto Benedetti	Bibliotecária
Mari José Sobieski Teixeira	Supervisor Administrativo
Ilse Teresinha Kipper Velloso	Técnico Administrativo
Vera Lucia Lousada Bica	Auxiliar Administrativo
Francielle Costa da Silva	Estagiária
Melissa Aurich Pettinelli	Estagiária

Programa Voluntários pela Vida

Jairo Rocha da Silva	Assistente Social
----------------------	-------------------

GEP - Hospital Cristo Redentor

Josué Bahlis	Coordenador GEP/HCR
Mariângela de Moraes Butori	Técnico Administrativo
Joana Paula Fagundes	Estagiária

GEP – Hospital Fêmeina

Luciano Schopf	Coordenador GEP/HF
Lúcia de Fátima da Motta	Auxiliar Técnico-Administrativo

Núcleo de Epidemiologia

Débora Meert	Auxiliar de Enfermagem
Angela dos Santos Trindade	Auxiliar de Enfermagem
Maria Cândida Baum	Auxiliar Administrativo

